

雪印種苗の緑肥作物特性一覽表 (都府県用)

◎: おすすめ ○: 適する

種類（草種名）	品 種	ページ	草丈 （cm）	総設置 目安 （kg/10a）	植栽タイプ		草 種		セッチェツの仕様				乾物収穫 （kg/10a）	植栽の環境		播 種 量 kg/10a	播 種 期		すき込み期 草丈 （生育Ⅲ期）	利 用 時
					休 眠	開 花	葉 面	根 部	シ ン	キ	ネ	キ		ネ	ネ		ネ	ネ		
カラシナ	PVP 辛 神	3	100-160	無難栽培は N8	○	○	○	○	○	○	○	○	400-800	○	○	1	5月～6月 8月下旬～9月上旬（中耕期）	2月～3月 10月下旬～11月上旬	土壌調整、サツマイモネコブセンチュウ対策に。	
	ハイオーツ	5	100-120	無難栽培は N5	○	○	○	○	○	○	○	○	500-800	○	○	10-15	4月上旬～6月上旬 8月中旬～9月上旬	2月下旬～3月上旬 8月下旬～11月上旬	ダイコン、ニンジン、ネギのモロの発生対策。 キヤンパ、ハナサの根の成長が抑制。	
	PVP スナイパー	6	100-120	無難栽培は N5	○	○	○	○	○	○	○	○	500-700	○	○	8-10	—	9月下旬～10月上旬 9月下旬～11月上旬 （無難栽培）	サツマイモネコブセンチュウ対策に。晩夏～冬の空堀を有効利用。 南九州など秋作適地では9月中旬～9月末の播種がましい。	
	とちゆたか	8	100-130	無難栽培は N5	○	○	○	○	○	○	○	○	600-800	○	○	晩秋5-8 すき込8-10	4月上旬～6月上旬 8月中旬～9月上旬	2月下旬～3月上旬 8月下旬～11月下旬	コンニャク、高原野菜の防風・寒対策に。	
	PVP たちいぶき	8	100-120	無難栽培は N5	○	○	○	○	○	○	○	○	500-700	○	○	6-8	—	8月下旬～9月上旬	サツマイモの発生対策。	
ライムギ	R-007（ウィーラー）	7	120-140	無難栽培は N5	○	○	○	○	○	○	○	○	600-900	○	○	6-8 10-15	3月下旬～5月上旬 9月上旬～10月中旬	1月下旬～4月中旬 10月～12月	秋播きで乾草管理や土壌改良が有効。 高所腐敗や果実腐敗の寒対策に。	
	緑春Ⅱ（レンズアブリルツ）	8	120-140	無難栽培は N5	○	○	○	○	○	○	○	○	600-900	○	○	6-8	3月下旬～5月上旬 9月上旬～10月中旬	1月下旬～4月中旬 10月～12月	高所腐敗や果実腐敗の寒対策に。	
ライコムギ	ライコムギ（タッカーボックス）	9	110-130	無難栽培は N5	○	○	○	○	○	○	○	○	600-900	○	○	晩秋3-5	—	10月下旬～11月下旬	野菜等の防風、防砂・寒風利用。	
ヘアリーベッチ	藤えもん（マッサ）	9	30-50	無難栽培は NO-2、 P・K 8 5	○	○	○	○	○	○	○	○	300-600	○	○	3-5	4月上旬～5月上旬 9月上旬～10月中旬	2月中旬～3月下旬 9月下旬～11月下旬	遊休地の防風、地力対策、秋の発生防止、水稲、大豆の前作緑肥。 寒太郎の温床利用（ミニシバの寒害として長期利用可）。	
	寒太郎（サバン）	9	30-50	無難栽培は NO-2、 P・K 8 5	○	○	○	○	○	○	○	○	300-650	○	○	3-5	4月上旬～5月上旬 9月上旬～10月中旬	2月中旬～3月下旬 9月下旬～11月下旬	遊休地の防風、地力対策、秋の発生防止、水稲、大豆の前作緑肥。	
	まめ助（ナモイ）	9	30-50	無難栽培は NO-2、 P・K 8 5	○	○	○	○	○	○	○	○	300-600	○	○	3-5	4月上旬～5月上旬 9月上旬～10月中旬	2月中旬～3月下旬 9月下旬～11月下旬	遊休地の防風、地力対策、秋の発生防止、水稲、大豆の前作緑肥。	
ベルシアフローバ	まめ小町（Marne-Komachi） 裏表紙	30-80	無難栽培は NO-2、 P・K 8 5	○	○	○	○	○	○	○	○	○	300-600	○	○	2-3	4月上旬～5月上旬 9月上旬～10月中旬	2月下旬～3月下旬 9月下旬～10月下旬	遊休地の防風、地力対策、秋の発生防止、水稲、大豆の前作緑肥。 年利用は30cm程度 秋播きと春播きは部化腐	
クリルシアフローバ	くれなゐ	11	30-60	無難栽培は NO-2、 P・K 8 5	○	○	○	○	○	○	○	○	300-600	○	○	2-3	4月上旬～5月上旬 9月上旬～10月中旬	2月下旬～3月下旬 9月下旬～10月下旬	遊休地の防風、地力対策、秋の発生防止、水稲、大豆の前作緑肥。 年利用は30cm程度 秋播きと春播きは部化腐	
レンゲ	レンゲ	11	30-50	無難栽培は NO-2、 P・K 8 5	○	○	○	○	○	○	○	○	200-300	○	○	3-4	8月中旬～9月上旬	9月中旬～10月下旬	遊休地の防風、地力対策、秋の発生防止、水稲、大豆の前作緑肥。 年利用は30cm程度 秋播きと春播きは部化腐	
イタリヤライグラス	ヤオイワセ PVP	12	100-120	無難栽培は NO-2、 P・K 8 5	○	○	○	○	○	○	○	○	600-800	○	○	4-5	9月上旬～10月中旬	10月上旬～11月中旬 2月下旬～3月中旬	水田前作緑肥、景観美化、 水田前作緑肥。	
アニマルライグラス	フェアウェー（フィングドロー）	20	100-140	無難栽培は NO-2、 P・K 8 5	○	○	○	○	○	○	○	○	—	○	○	3-5	9月中旬～10月上旬	3月 9月下旬～11月中旬	果樹園の草生栽培に。	
セズバニア	田助	12	150-200	無難栽培は NO-3、 P・K 8 5	○	○	○	○	○	○	○	○	400-600	○	○	晩秋3-5 10-15	6月中旬～7月中旬	5月下旬～8月中旬	水田や乾牧地の土壌調整性・排水改善と地力向上に。	
ヒエ	青葉ミレット	12	100-150	無難栽培は N5	○	○	○	○	○	○	○	○	500-1000	○	○	3-5	6月上旬～7月上旬	5月中旬～7月下旬	水田乾牧地や遊牧がしやすい圃場の有機物増進に。	
スエーデングラス	ねまへらそう（スーバーダン2）	13	250-300	無難栽培は N5	○	○	○	○	○	○	○	○	600-900	○	○	5	5月下旬～7月下旬 5月～7月（ハズ）	5月中旬～8月上旬（寒地） 5月～8月（ハズ）	ダイコン、ニンジンの腐敗対策。 サツマイモネコブセンチュウ対策に。	
ソルガム	つちたろう（ジャンボ）	13	280-330	無難栽培は N5	○	○	○	○	○	○	○	○	700-1000	○	○	5	5月下旬～7月下旬 5月～7月（ハズ）	5月中旬～8月上旬（寒地） 5月～8月（ハズ）	ハウス、キュウリ、トマト、イチゴ、露地野菜の有機物増進に。	
	短Rソルゴ	14	150-200	無難栽培は N5	○	○	○	○	○	○	○	○	—	○	○	晩秋4-5 10-15	5月下旬～7月下旬	5月中旬～8月上旬	ドリフトガード、防風用。	
	グリーンソルゴ（スーパーダン）	14	250-300	無難栽培は N5	○	○	○	○	○	○	○	○	700-1000	○	○	4-5	5月下旬～7月下旬（寒地） 5月～8月（ハズ）	5月中旬～8月上旬（寒地） 5月～8月（ハズ）	ハウス、キュウリ、トマト、イチゴ、露地野菜の有機物増進に。	
	ネマレット（ADR300）	14	200-250	無難栽培は N5	○	○	○	○	○	○	○	○	1000-1500	○	○	4	6月上旬～7月下旬（寒地） 5月～8月（ハズ）	5月中旬～8月上旬（寒地） 5月～8月（ハズ）	ソルガム類の刈りや他の影響を受けない。 キダネガサセンチュウおよびサツマイモネコブセンチュウ対策に。	
	ネマキング	15	120-150	無難栽培は NO-3、 P・K 8 5	○	○	○	○	○	○	○	○	300-500	○	○	6-9	7月（寒地） 6月～7月（ハズ）	5月下旬～7月中旬 5月下旬～7月中旬（中耕・電草対策）	キュウリ、トマト、メロン、スイカ、サツマイモの各種緑生対策に。	
	ネマックス	15	120-150	無難栽培は NO-3、 P・K 8 6	○	○	○	○	○	○	○	○	300-500	○	○	6-9	7月（寒地） 6月～7月（ハズ）	5月下旬～7月中旬 5月下旬～7月中旬（中耕・電草対策）	キュウリ、トマト、メロン、スイカ、サツマイモの各種緑生対策に。	
	ネマコロリ	16	120-200	無難栽培は NO-3、 P・K 8 5	○	○	○	○	○	○	○	○	400-600	○	○	6-8	7月（寒地） 6月～7月（ハズ）	5月下旬～7月下旬 5月下旬～7月下旬（中耕・電草対策）	キュウリ、トマト、メロン、スイカ、サツマイモの各種緑生対策に。	
	ソイルクリーン	17	200-250	無難栽培は N5	○	○	○	○	○	○	○	○	600-800	○	○	4-5	6月下旬～7月上旬	5月中旬～8月中旬	ダイコン、ニンジン、キュウリ、スイカ、メロンの緑生対策に。	
	ナツカゼ	17	220-240	無難栽培は N5	○	○	○	○	○	○	○	○	500-800	○	○	4-5	6月下旬～7月上旬	5月中旬～8月中旬	ダイコン、ニンジン、キュウリ、スイカ、メロンの緑生対策に。	
	サンマリノ（NSデュカット）	18	140-160	無難栽培は N5 N・P・K 8 5	○	○	○	○	○	○	○	○	500-800	○	○	4-5	5月下旬～6月中旬 3月～4月	4月中旬～8月上旬	短草生で景観美化に適する。 景観美化、土壌改良に効果的。 底土の前作緑肥。	
	アンジェリア	18	60-80	無難栽培は NO-2、P・K 8 5	○	○	○	○	○	○	○	○	300-600	○	○	2-3	4月上旬～5月中旬 10月下旬～11月中旬	2月下旬～3月中旬 11月下旬～12月上旬	景観美化、土壌改良に効果的。 底土の前作緑肥。	
	キラシラ（メデックス）	18	80-120	無難栽培は NO-2、P・K 8 5	○	○	○	○	○	○	○	○	400-800	○	○	2-3	4月上旬～5月中旬 3月 11月	2月下旬～3月中旬 11月下旬～12月上旬	景観美化、遊休地対策にも。	
	らくらくギ（ラマタ）	19	（自然発育） 20-30	無難栽培は N5	○	○	○	○	○	○	○	○	100-200	○	○	晩秋3-5 10-15	5月中旬～6月下旬	8月下旬～9月中旬	コンニャクの取作利用、つり橋の草生利用、遊休地の草生対策に。	
オオナササグサ	ST-1（SAブラウン）	19	40-70	無難栽培は NO-5	○	○	○	○	○	○	○	○	—	○	○	2-3	9月	8月下旬～11月上旬	草生栽培、刈取り管理不用で省力化。	
チアラス	ベンサコラ	19	80-100	無難栽培は N5	○	○	○	○	○	○	○	○	400-500	○	○	1-2	—	9月下旬～11月上旬	茶園・果樹園等でのハバンマル利用、畝間利用。	
ハビアグラス	ペンサコラ	20	30-70	無難栽培は N5	○	○	○	○	○	○	○	○	—	○	○	4-5	5月下旬～7月中旬	5月～7月	ミカンなどの果樹園の草生栽培。	
トールフェス	ダイナマイト LS	20	50-70	無難栽培は N5 N・P・K 8 5	○	○	○	○	○	○	○	○	—	○	○	5-10	3月中旬～4月下旬 9月下旬～10月中旬	2月下旬～4月上旬 10月上旬～11月上旬	リンゴなどの果樹園の草生栽培。	
ケクオニールグラス	ヌーブループラス	20	50	無難栽培は N5 N・P・K 8 5	○	○	○	○	○	○	○	○	—	○	○	3-5	4月～5月 8月下旬～9月下旬	3月中旬～4月下旬 9月下旬～10月上旬	リンゴなどの果樹園の草生栽培。	
シロクローバ	アババール	20	10-20	無難栽培は N5 N・P・K 8 5	○	○	○	○	○	○	○	○	—	○	○	2-3	4月中旬～5月下旬 9月11月～10月上旬	2月下旬～4月上旬 10月上旬～11月上旬	リンゴなどの果樹園の草生栽培。	
マリーゴールド	アリカトル（リカウラ） （ガリシス）	26	50-60	無難栽培は N5 N・P・K 8 5	○	○	○	○	○	○	○	○	500-700	○	○	3.2-0.5	6月	5月上旬～7月中旬	果樹園の草生栽培。 （店番800-90日）	
クリセノバ	CY-2（シーワイソー） PVP	23	50-80	無難栽培は N5	○	○	○	○	○	○	○	○	—	○	○	20	8月中旬～9月上旬	5月上旬～9月中旬	緑生対策と景観美化に（健田日歌として80日前後が必要）。	
ダイカンドラ	ダイカンドラ	20	10	無難栽培は N5 N・P・K 8 5	○	○	○	○	○	○	○	○	—	○	○	5-10	5月上旬～7月中旬	4月中旬～7月中旬	果樹園の草生栽培所に。 草生栽培、法面。	

① サツマイモネゴブセンチュウの系統によっては抵抗性を示さないものがあります。② 秋播き越冬栽培で茎葉4以上すき込んだ場合に効果があります。③ 卵虫抑制効果を期待する場合 ④ 年内利用。越冬利用する場合には

*海外持出禁止(農林水産大臣公示有)