



緑肥作物特性表 (2023)

◎：おすすめ ○：適する
2022年9月現在の品種ラインアップです。

北海道用

品 種※	種 類 (草種)	センチュウ抑制				緑肥の効果							利用					播種量 (kg/10a)	播種期 (月・旬)	特 性		
		キタネグサレ	キタネコブ	ダイズシスト	サツマイモネコブ ¹⁾	有機物の補給	空中窒素の固定	菌根菌の増殖	透水性の改善	塩類除去	土壌保全	障壁	景観美化	休閑	短期休閑	後作	間作				越冬	施設ハウス
ヘイオーツ	アウェナ ストリゴサ (エンバク野生種)	◎	◎			◎	◎		◎	◎				◎	◎	◎			◎	10～15	4下～6中 7下～9上	初期生育旺盛で多収。キタネグサレセンチュウ対抗植物。 センチュウ対策は15kg/10a、9月播きは20kg/10a。
キカラシ (メテックス)	シロガラシ					◎		◎		◎				◎	◎				◎	2～3	4下～6中 7下～8下	生育旺盛で多収。テンサイの前作に適する（収量性を改善）。 鮮やかな黄色い花をつける。
辛神 2) ★	カラシナ						◎		◎		◎			◎	◎				◎	コート 1.0～1.5	露地：5月 ハウス：2～4月	辛みの成分含量が高いアブラナ科緑肥。着蕾～開花始の茎葉部の多い 時期にできるだけ細断してすき込む。ハウス等残肥が多い場合は無施肥 でも可。景観緑肥にはキカラシのほうが良い。テンサイ根腐病、ホ ウレンソウ萎凋病、コムギ立枯病の発病軽減効果が期待できる。
																			後作:8月 (ハウスも)		8月上旬までにできるだけ播種を終える。ハウス等残肥が多い場 合は無施肥でも可。	
まめ助 (ナモイ)	ヘアリーベッチ					◎	◎	◎		◎				◎	◎					5	5上～6中 7下～8中	コムギや早出し作物後に播種できるマメ科緑肥。根粒菌も着生。
藤えもん (マッサ)	ヘアリーベッチ					◎	◎	◎		◎			◎	◎	◎					4～5	5上～6中 7下～8中	耐湿性に優れ、根粒菌も着生。越冬する場合もあるので、しっかりとすき込む。
寒太郎 (サバン)	ヘアリーベッチ					◎	◎	◎		◎			◎	◎	◎			◎		5	5上～6中 9上～9中	越冬性と耐湿性に優れる。長期栽培で雑草抑制が期待できる。
まめゆたか	まめ助(ナモイ):5kg とちゆたか:3kg 混播セット					◎	◎	◎		◎				◎	◎					8	5上～6中 7下～8下	直立性エンバク「とちゆたか」とヘアリーベッチ「まめ助」との 混播。根粒菌の着生と8月下旬播種でも可能なセット。
ねまへらそう (スーパーダン2)	スーダングラス	◎	◎			◎		◎		◎	◎		◎						◎	5	露地：6～7月 ハウス：5～8月	ヘイオーツに準じてキタネグサレセンチュウを減らす。秋播きコ ムギの休閑に適する。栽培期間が長く、多収。ドリフト対策の障 壁作物として利用。
つちたろう (ジャンボ)	ソルガム	◎				◎	◎		◎		◎			◎					◎	5	露地：6～7月	低温伸長性に優れ、初期生育が良好。種子が小粒でスタンド形成 が良好。ドリフト対策の障壁作物として利用できる。
																			ハウス：5～8月		クリーンアップ利用は無施肥。サツマイモネコブセンチュウ対抗植物。	
くれない	クリムソングローバ		◎			◎	◎	◎		◎				◎	◎					2～3	4下～6中 7下～8上	ダイズシストセンチュウ対抗植物。根粒菌により空中窒素を固定し、 地力を増強。深紅の花が景観美化に適する（春播きの開花）。
アンジェリア	ハゼリソウ					◎				◎		◎		◎						2～3	5～6月	春播きで生育旺盛、被覆が早く雑草対策となる。綺麗な紫色の花 が咲き、蜂花植物としても適する。花は8月まで楽しめる。 前作で栽培するとネギの生育が良好（府県で実証）。
NSクルナ (NS Krana)	ヒマワリ					◎		◎		◎		◎	◎	◎	◎					条播：0.5 散播：1.0	5中～7上（春播き） 7中～8中（夏播き）	春播きで開花し、景観利用と有機物補給に。 夏播きは開花期に達しない。 バーティシリウム半身萎凋病抵抗性に優れる。
とちゆたか	エンバク		◎			◎		◎		◎	◎			◎	◎				後作・休閑： 10～15 間作：5～8		4下～6中 7下～8中	耐病性・耐倒伏性の直立性エンバク。園芸作物や早春の防風作物に 適する。カボチャの間作や種ばれいしの隔離作物として利用。ドリ フト対策の障壁作物として利用できる。
R-007 (ウィーラー)	ライムギ	◎	◎			◎		◎		◎	◎			◎	◎			◎		10～15	8下～9上(年内) 9中～9下(越冬)	タマネギの後作緑肥に適する（保肥力の増加や土を軟らかくする）。 越冬させて早春の土壌侵食防止に適する。ドリフト対策の障壁作 物として利用。秋播きでキタネグサレセンチュウを抑制。
メジウム	アカクロローバ		◎			◎	◎	◎	◎		◎			◎				◎	休閑：2～3 コムギ間作： 3～4	5～6月 4月（出来る だけ早く）	根粒菌により空中窒素を固定し、地力を増強。ダイズシストセン チュウ対抗植物。コムギ間作は適度に土壌水分があるうちに播種 する。	
スナイパー ★	エンバク		◎			◎		◎		◎				◎	◎			◎		10	露地：8下～9上 ハウス：8下～9上 2重・加温ハウス：11月	エンバク「スワン」よりもさらに早生タイプのエンバク。 ハウス栽培後や春先の有機物補給に。 ハウスは残肥を利用。
スワン	エンバク		◎			◎		◎		◎				◎	◎					15～20	7下～8中	早生エンバク。

都府県用

品 種※	種 類 (草種)	センチュウ抑制					緑肥の効果					利用					播種量 (kg/10a)	播種期 (月・旬)			特 性				
		サツマイモネコブ (1)	ジャウネコブ	キタネグサレ	アレナリアネコブ	ミナミネグサレ	クルミネグサレ	ナミイシユク	ダイズシスト	空中窒素の固定	透水性の改善	塩類除去	土壌保全	障壁	景観美化	休閑		後作	果樹草生	間作		越冬	施設ハウス	東北・高冷地	一般地
辛神 2) ★	カラシナ	○ (3)										○	◎		◎					◎◎	1	5～6月 8下～9上 (年内利用)	3～4月 10中～11上	2～3月 10下～11中	土壌病害、サツマイモネコブセンチュウ対策に。
ヘイオーツ	アウェナストリガ (エンバク野生種)		◎		◎	○				○		◎◎	◎	◎	◎		○	◎		◎◎	10～15	4上～6上 8中～9上	3～5月 8下～9中 10中～11上	2下～5上 8下～9下 10下～11下	ダイコン、ニンジン、ナガイモの線虫対策。 キャベツ、ハクサイの根こぶ病対策に。
スナイパー ★	エンバク	◎	◎							○		◎				◎					8～10	—	8下～9中	9月 9下～10上 離島(種子島等)	サツマイモネコブセンチュウ対策に、晩夏～ 冬の空畑を有効利用。 南九州など秋季温暖な地域では9月中旬～9月 末の播種が望ましい。
とちゆたか	エンバク		◎							○		◎◎	◎	◎		◎◎			◎◎	間作5～8 すき込み: 8～10	4上～6上 8中～9上	3～5月 8下～9中 10中～11上	2下～5上 8下～9下 10下～11下	コンニャク、高原野菜の防風・敷ワラに。	
たちいぶき ★	エンバク	◎	◎							○		◎				◎					6～8	—	8下～9上	8下～9中	サツマイモの線虫対策。
R-007 (ウィーラー)	ライムギ		◎		○					○		◎◎	◎	◎		◎◎		◎		◎	6～8 10～15	3下～5上 9上～10中	3上～4中 9下～12上	1下～4中 10～12月	秋播きでキタネグサレセンチュウ対策に。 春播きで雑草管理や土壌流出防止に。

1) サツマイモネコブセンチュウの系統によっては抵抗性を示さないものがあります。2) アブラナ科野菜の根こぶ病発生圃場での使用はお避けください。

3) 秋播き越冬栽培で茎葉4t/10a以上すき込んだ場合に効果がありません。

※品種名が商品名と異なる場合は、商品名の下に書かれている()内に品種名を記載しています。

★農林水産省登録品種 海外持出禁止(農林水産大臣公示) 「たちいぶき」は2023年8月20日に品種登録失効予定です。

都府県用

品 種※	種 類 (草種)	センチュウ抑制					緑肥の効果					利用					播種量 (kg/10a)	播種期 (月・旬)			特 性				
		サツマイモネコブ1)	ジャワネコブ	カタネコブ	アレナリアネコブ	ミナミネグサレ	クルミネグサレ	ナミイシユク	ダイズシスト	空中窒素の固定	透水性の改善	塩類除去	土壌保全	障壁	景観美化	休閑		後作	果樹草生	間作		越冬	施設ハウス	東北・高冷地	一般地
緑春Ⅱ (レンズアブラツシイ)	ライムギ		◎						○		◎◎			○	○	○	○	○	○	○	6~8	3下~5上 9上~10中	3上~4中 9下~12上	1下~4中 10~12月	高原野菜や果樹類の敷ワラに。 果樹園の草生栽培。
らくらくムギ (ラマタ)	オオムギ										◎			○				◎			間作3~5 散播8~10	5中~6下2)	4上~6中	3下~5中	春播きをすることでほとんど出穂せず、コンニャクなどの間作利用が可能。
ネマレット (ADR300)	パールミレット	○	◎		○				○◎◎										◎		4	6上~7下	5下~8中	5中~9上	ソルガム類のいや地の影響を受けない。 カタネグサレセンチュウおよびサツマイモネコブセンチュウ対策に。
つちたろう (ジャンボ)	ソルガム	◎	◎							○◎◎				◎◎						◎	5	5下~7下 (露地) 5~7月 (ハウス)	5中~8中 (露地) 5~8月 (ハウス)	5上~9上 (露地) 5~8月 (ハウス)	サツマイモネコブセンチュウ対策に。 ハウス、キュウリ、トマト、イチゴ、露地野菜の有機物補給に。
ねまへらそう (スーパーダン2)	スーダングラス	○	◎		○				○◎◎					◎◎						◎	5	5下~7下 (露地) 5~7月 (ハウス)	5中~8上 (露地) 5~8月 (ハウス)	5上~8中 (露地) 5~8月 (ハウス)	ダイコン、ニンジンの線虫対策。
短尺ソルゴー	ソルガム		◎						○◎◎◎					○			◎				条播1~2 散播4~5	5下~7下	5中~8上	5~8月	ドリフトガード、防風対策に。
グリーンソルゴー (スーパーダン)	ソルガム		◎						○◎◎				◎◎						◎		4~5	5下~7下	5中~8上	5~8月	ハウス、キュウリ、トマト、イチゴ、露地野菜の有機物補給に。
ヤヨイワセ★	イタリアライグラス		◎						○◎◎					○				◎			4~5	9上~10中	9下~10下	10上~11中 2下~3中	水田裏作緑肥。
トップガン	テフグラス		◎						○◎		◎		◎◎	◎◎	◎				◎		1~2	—	5中~7中	3中~9下	茶園・果樹園等でのリビングマルチ利用、畝間利用。
ゾロ	オナギナグサ		◎						◎	◎◎	◎◎			◎							2~3	9月	9中~10中	9下~11上	草生栽培に。刈取り管理不用で省力化。
藤えもん (マッサ)	ヘアリーベッチ								◎		◎		◎◎◎◎	◎			◎				3~5	4上~5上 9上~10中3)	3上~4上 9中~11上	2中~3下 9下~11下	遊休地の雑草・地力対策、柿の草生栽培。 水稲、大豆の前作緑肥。 寒太郎との混播利用でミツバチの蜜源として長期利用可。
寒太郎 (サバン)	ヘアリーベッチ								◎		◎		◎◎◎◎	◎			◎				3~5	4上~5上 9上~10中	3上~4上 9中~11上	2中~3下 9下~11下	寒・高冷地での遊休地の雑草・地力対策。 水稲、大豆の前作緑肥。
まめ助 (ナモイ)	ヘアリーベッチ								◎		◎		◎◎◎◎	◎			◎				3~5	4上~5上 9上~10中3)	3上~4上 9中~11上	2中~3下 9下~11下	遊休地の雑草・地力対策、柿の草生栽培。 水稲、大豆の前作緑肥。
レンゲ	レンゲ								◎		◎		◎	◎			◎		◎		3~4	8中~9上4)	9上~10上	9中~10下	水田前作緑肥、景観美化。
くれない	グリンノグロバ								◎◎		○		◎◎◎				◎				2~3	4上~5上 9上~10上4)	3上~4上 9中~10中	2下~3下 9下~10下	景観美化、ダイズシストセンチュウ対策に。
まめ小町 (Mame-komachi)	ベルシアノグロバ								◎◎		○		◎◎◎				◎				2~3	4上~5上 8上~9上5) 9上~10上4)	3上~4上 8下~9中5) 9中~10中	2下~3下 9月5) 9下~10下	耐湿性が比較的強い。 芳香性のある花で景観美化に適する。 ダイズシストセンチュウ対策に。
ネマキング	クロタリリア	◎◎◎◎	◎◎◎◎	◎◎◎◎	◎◎◎◎	◎◎◎◎	◎◎◎◎	◎◎◎◎	◎◎◎◎	◎		◎	◎◎◎◎						◎		6~9	7月(露地) 6~7月 (ハウス)	5下~7中	5上~8上 2下~9下 (沖縄・奄美諸島)	キュウリ、トマト、メロン、スイカ、サツマイモの各種線虫対策に。
ネマックス	クロタリリア	◎◎◎◎	◎◎◎◎	◎◎◎◎	◎◎◎◎	◎◎◎◎	◎◎◎◎	◎◎◎◎	◎◎◎◎	◎		◎	◎◎◎						◎		6~9	7月(露地) 6~7月 (ハウス)	5下~7中	5上~8上 2下~9下 (沖縄・奄美諸島)	キュウリ、トマト、メロン、スイカ、サツマイモの各種線虫対策に。
ネマコロリ	クロタリリア	◎	○		○				◎◎		◎		◎◎◎						◎		6~8	7月(露地) 6~7月 (ハウス)	5中~7下	5上~8上 2下~9下 (沖縄・奄美諸島)	キュウリ、トマト、メロン、スイカのサツマイモネコブセンチュウ対策に。
田助	セスバニア								◎◎		◎		◎◎								条播4 散播5	6中~7中	5下~7下	5上~8中	水田転換畑の土壌物理性・排水改善と地力向上に。
ダイカンドラ	ダイカンドラ										○						◎				5~10	5下~6下	5上~7中	4中~7中	果樹園の難作業場所に。
アンジェリア	ハゼリソウ										◎		◎◎	◎				◎			2~3	4上~5中	3~4月 10下~11中	2下~3中6) 11中~12上	景観美化。 長ネギの前作緑肥。
サンマリノ (NSデュカット)	ヒマワリ											◎		◎◎◎							条播1.0~1.5 散播1.5~2.0	5下~6中	5中~7上	4中~8上	短稈早生で景観美化に適する。 パーティシリウム病の発生圃場へは作付けを避ける。
NSクルナ (NS Kruna)	ヒマワリ											◎		◎◎◎							条播1.0~1.5 散播1.5~2.0	5下~6中	5中~7上	4中~8上	サンマリノよりも30cmほど大柄で開花が一週間ほど遅い。 パーティシリウム半萎凋病抵抗性に優れる。
キカラシ (メテックス)	シロガラシ								○	○		◎◎◎							◎		2~3	4上~5中	3月 11月	2下~3中6) 11中~12上	景観美化、遊休地対策にも。
ソイルクリーン	ギニアグラス	◎◎◎◎	◎◎◎◎	◎◎◎◎	◎◎◎◎				○◎◎					◎◎					◎		条播0.3~0.5 散播1.0~1.5	6下~7上	6上~8上	5中~8中	ダイコン、ニンジン、キュウリ、スイカ、メロンの線虫対策に。
ナツカゼ	ギニアグラス	◎◎◎◎	◎◎◎◎	◎◎◎◎	◎◎◎◎				○◎◎					◎◎					◎		条播0.3~0.5 散播1.0~1.5 コート2~3	6下~7上	6上~8上	5中~8中	ダイコン、ニンジン、キュウリ、スイカ、メロンの線虫対策に。
マンモスタリア8 (ピリケン)	イタリアライグラス		◎						○	○				○			○	○			3~4	4月 9中~10中	3中~4中 9中~10下	2下~4上 9下~11上	ナシなどの果樹園の草生栽培。
アバパール	シロクローバ								◎		○		◎◎	○							2~3	4中~5下 8下~9下	3中~4下 9下~10中	2下~4上 10上~11上	果樹園の草生栽培。
アフリカントール (クワカージャック ダブルミックス)	マリーゴールド	◎		○	◎◎	○	○				○		◎◎◎◎								0.2~0.5	6月	5下~7上	5上~7中	線虫対策と景観美化に(栽培日数として80日前後が必要)。

1) サツマイモネコブセンチュウの系統によっては抵抗性を示さないものがあります。2) 気象条件により枯れ上がらない場合があります。
3) 年内利用。越冬利用する場合には、越冬性に優れる「寒太郎」をお勧めします。4) 冬季の気候条件によって、越冬割合が異なります。(多雪地帯では越冬不可)
5) 年内利用。6) 虫害の発生が予想されますので、ご注意ください。

※品種名が商品名と異なる場合は、商品名の下に書かれている()内に品種名を記載しています。★農林水産省登録品種 海外持出禁止(農林水産大臣公示有)

新発売 パールミレット **ネマレット** (ADR300) 都府県限定

土壌を選ばずよく育ち、カタネグサレセンチュウおよびサツマイモネコブセンチュウを抑制する!



特性と効果

- 酸性土壌、粘土質土壌でもよく生育します。
- ソルガム類のいや地の影響を受けずに生育します。
- 播種後60日程度で出穂します。
- カタネグサレセンチュウおよびサツマイモネコブセンチュウを抑制する効果が高く、ダイコンやゴボウへの緑肥として適しています。

ソルガム **つちたろう** (ジャンボ)

サツマイモネコブセンチュウに抑制効果をもつ緑肥用ソルガム!!



特性と効果

- 初期生育が旺盛で、粗大有機物生産量がとても多く、50~60日で5~6t/10a(都府県)のすき込みが出来ます。
- サツマイモネコブセンチュウに高い抑制効果を持ち、後作物の被害を抑えます。
- 窒素、カリの吸収量が多く、ハウスや畑の残肥を吸収し、塩基バランスの改善に役立ちます。

ソルガム **グリーンソルゴー** (スーパーダン) 都府県限定

短期間で多量の有機物、まさに緑肥の代表選手



特性と効果

- 粗大有機物生産量が多く、短期緑肥として露地野菜の前後作に適します。(40~50日で3~5t/10a)
- 窒素、カリの吸肥力が強く、過剰な肥料成分の除去に役立ちます。(窒素吸収除去量8~12kg/10a)

クロタリリア **ネマックス** 都府県限定

各種線虫対策に効果を発揮!



特性と効果

- ネマキングと同様の丸葉タイプです。
- 夏場の地力増進に適します。
- 開花始めは初秋からです(短日条件で開花します)。
- ネコブセンチュウ、ミナミネグサレセンチュウ、ダイズシストセンチュウなど各種線虫への抑制効果が期待できます。

スーダングラス **ねまへらそう** (スーパーダン2)

夏場のカタネグサレセンチュウ対抗植物!



特性と効果

- カタネグサレセンチュウやサツマイモネコブセンチュウの密度を減らし、後作物のセンチュウ被害を抑えます。夏場にヘイオーツの生育が緩慢になる地域で、特に威力を発揮します。
- ギニアグラスなどの暖地型草種に比較すると種子が大きいいため播きやすく、初期生育も良好で栽培が容易です。

ソルガム **短尺ソルゴー** 都府県限定

防風・ドリフトガードに適する! お茶・園芸作物を強風から守る



特性と効果

- 耐倒伏性に優れ、お茶の幼木や園芸作物の防風に適します。
- 草丈1.5~2.0m前後で生育が止まるので遮光が少なく、刈り込む手間が省けます。
- 出穂したら穂を切り落とすことによって、倒れにくくなり長期利用が可能になります。
- 10月中旬以降、敷わらおよびすき込み利用とします。

セスバニア **でんすけ 田助** 都府県限定

耐湿性に優れるマメ科作物



特性と効果

- 耐湿性に優れるため、水田転換畑で生育が旺盛で、転作小麦の前作に適します。
- マメ科のため炭素率(C/N比)が低く、後作小麦等への窒素飢餓の心配がありません。
- マメ科の中では初期生育が良好で、草丈は1.5~2.0mにもなり、多収(2.5~3.0t/10a)で良質な有機物を補給できます。
- 直根性であるため、湿害のある圃場での排水性、通気性の改善に効果的です。

クロタリリア **ネマコロリ** 都府県限定

サツマイモネコブセンチュウを強力に減らす!



特性と効果

- クロタリリア属の中では初期生育が極めて早く、空中窒素を固定するため、後作の窒素施肥量を削減できます。
- キュウリ、メロン、トマト等の果菜類のサツマイモネコブセンチュウ対策に効果があります。また、サトウキビ畑の有機物補給に適します。



ベルシアンクローバ まめ小町 (Mame-Komachi)

都府県
限定

ピンク色の香しい花が特徴的なクローバ

特性と効果

- 耐湿性が比較的強く、排水性が若干悪い圃場でも枯死することなく生育します。
- 次から次へと花が咲き、開花は1ヵ月ほど続きます。また、花には芳香性があります。
- ダイズシストセンチュウを抑制する効果が高く、ダイズやエダマメの緑肥として適しています。



かんたろう

ヘアリーベッチ 寒太郎 (サバン)

越冬性に優れる晩生品種



特性と効果

- 越冬性に優れ、積雪地帯での秋まき越冬栽培のご利用をお勧めします。
- 晩生品種で生育期間が長いので、早生品種に比べて長期にわたり雑草抑制効果が期待できます。
- 水稻・大豆の前作緑肥や果樹園の草生栽培にも適しています。

ふじえもん

ヘアリーベッチ 藤えもん (マッサ)

初期の雑草抑制に優れる!



特性と効果

- 根粒菌が空中窒素を固定し、土壌を肥沃化します。
- 生育、開花が早いので、早期すき込みに適します。
- 寒太郎との混播利用で長期的な開花リレーが可能となり、ミツバチの蜜源としても利用されています。
- 水稻・大豆の前作緑肥や果樹園の草生栽培にも適します。

アウェナ ストリゴサ(エンバク野生種) ヘイオーツ

キタネグサレセンチュウ抑制効果により全国各地で利用拡大中



特性と効果

- 発芽が早く、初期生育が旺盛で分けつが多く、多収の品種です。
- ダイコン、ニンジン等の根菜類の大敵であるキタネグサレセンチュウを抑制します。
- ジャガイモそうか病やアブラナ科野菜の根こぶ病の発生を軽減します。
- 栽培が容易ですき込みにより土壌がフカフカになります。

エンバク スナイパー PVP

農林水産省品種登録第23056号
海外持出禁止(農林水産大臣公示有)

サツマイモネコブセンチュウを抑制するエンバク!



特性と効果

- サツマイモネコブセンチュウに対し高い抑制効果があります。
※北海道では未確認
- 生育が早く多収な極早生品種です。
- 細葉タイプのスリムな草姿ですが、出穂が早いので乾物量をかせげます。
- 年内すき込みが可能なので、春先の農作業に余裕が持てます。

ライムギ R-007 (ウィーラー)

アール ゼロ セロ セブン

キタネグサレセンチュウ抑制型品種! 越冬性に優れる中晩生ライムギ



特性と効果

- 秋播きでキタネグサレセンチュウ被害の軽減効果が高いライムギです。
- 雪腐病抵抗性に優れ、積雪期間の長い地域に適する中晩生品種です。

ライムギ 緑春II (レンズ アブルツツイ)

都府県
限定

早春の低温伸長性が良好な極早生ライムギ



特性と効果

- 耐寒・耐雪性が優れ、高原野菜の後作に適します。
- 早春の低温伸長性が良く、強風から表土を守ります。
- 果菜類等の防風・敷わら利用としても適します。

エダマメ
エンドウ
インゲン
スイトコー
カボチャ
ブロッコリー
キャベツ
ダイコン
コマツナ
レタス
レタス/ニンジン
ホウレンソウ
販売資材
絵袋・小袋
緑肥作物

カラシナ 辛神 PVP 農林水産省品種登録 第22067号 海外持出禁止(農林水産大臣公示有)

辛味成分高含有品種で土壌病害線虫の抑制効果大



特性と効果

- 茎葉には辛味成分が多く含まれており、土壌にすき込むことで土壌病原菌低減効果が期待できます。
- テンサイ根腐病、ジャガイモ黒あざ病、ホウレンソウ萎凋病、トマト青枯病、サツマイモネコブセンチュウ害などの被害低減が期待できます。

- 周囲にアブラナ科野菜がある場所は、栽培を避けてください。
- アブラナ科野菜の根こぶ病発生圃場では、ヘイオーツをご利用ください。
- ハウスで利用する場合は風通しをよくして、細断・すき込みを行い、その後十分に灌水してからビニール被覆すると効果が安定します。
- サツマイモネコブセンチュウの抑制効果は、越冬利用ですき込み時の生収量が4t/10a以上の場合に認められています。

ギニアグラス ソイルクリーン 都府県限定

線虫抑制効果と多量の有機物が同時に得られるギニアグラス



特性と効果

- 各種ネコブセンチュウ(サツマイモネコブ、ジャワネコブ、キタネコブ)抑制効果が非常に高くキタネグサレセンチュウにもある程度の効果を持つので、果菜類や根菜類への緑肥に適します。
- ソルガムより線虫抑制効果は安定しており、短期多収型なので、ソルガムの代替として適します。
- 従来のギニアグラスよりも初期生育が早く、雑草競合にも優れる品種です。

クリムソンクローバ ぐれない

地力増進と景観緑肥 ダイズシストセンチュウ被害軽減に適する!



特性と効果

- 深根性の一年生(越年性)クローバです。株での再生はしません。
- 綺麗な深紅の花が咲き、景観美化に適します。
- 根粒菌が空中窒素を固定し、土壌を肥沃化します。
- ダイズシストセンチュウを抑制し、被害を軽減することが期待できます。

ヒマワリ サンマリノ (NSデュカット) 都府県限定

景観利用に適したヒマワリ



特性と効果

- 従来の景観用ヒマワリに比べ開花が早く、草丈も低い品種です。
- 花は目線の高さで、揃いが良く、大輪で見栄え良好です。

※パーティシリウム半身萎凋病に対する抵抗性は弱いため、本病発生履歴のある圃場での栽培はお控えください。

オオムギ らくらくムギ (ラマタ)

都府県限定

リビングマルチ利用できるオオムギ



特性と効果

- 春播きをすることで、ほとんど出穂せずコンニャクなどで間作利用が可能です。
- 夏の暑さで自然と枯れあがります。
- 春播きした場合、自然草高は30cm程度にしかならず主作物の邪魔になりません。

シロガラシ キカラシ (メテックス)

生育旺盛なアブラナ科景観緑肥作物!



特性と効果

- 黄色の花を一面に咲かせ、景観緑肥として適します。
- 春播きでは播種後40~50日(北海道)、50~60日(都府県)で開花します。

※播種予定地の近くにアブラナ科野菜がある場合は他草種をお使いください。

ハゼリソウ アンジェリア

紫色の花が景観美化と長ネギの品質向上に!



特性と効果

- 発芽・初期生育が旺盛な品種です。
- 紫色の花を一面に咲かせ、景観緑肥として適します。
- 長ネギの前作に入れると、増収と品質の向上が期待できます。

新発売 ヒマワリ NSクルナ (NS Kurna)

“王冠”の名を冠した大柄景観緑肥



特性と効果

- パーティシリウム半身萎凋病抵抗性に優れるヒマワリです。
- 大柄な草姿であることから、粗大有機物補給に適します。
- 北海道では、春播きで開花しますが夏播きでは開花しません。

雪印種苗の野菜品種一覧

種類名	品 種 名	種子 処理	品種 登録	販 売 規 格			販売 総袋 小分け袋	播種量のめやす (10アール)
				元詰標準	元詰総袋	元詰小袋		
エダマメ	神風香 (登録名称GLYSB1021)	FC	★	1 ^{ポツ} ドル (生種子あり)	70ml	30ml	○	4～9リットル
	味風香 (登録名称GLYSB1019)	FC	★	1 ^{ポツ} ドル (生種子あり)	70ml	30ml	○	
	夏風香 (登録名称GLYSB1020)	FC	★	1 ^{ポツ} ドル (生種子あり)	70ml	30ml	○	
	青祭 (出願名称GLYSB1023)	FC	▲	1 ^{ポツ} ドル (生種子あり)	70ml	30ml	○	
	青雫	FC	★	1 ^{ポツ} ドル (生種子あり)	70ml	30ml	○	
	青豊	FC	★	1 ^{ポツ} ドル (生種子あり)	70ml	30ml	○	
	恋姫	生	★	1 ^{ポツ} ドル	70ml	30ml	○	
	味太郎	生		1 ^{ポツ} ドル	70ml	30ml	○	
	サッポロミドリ	FC		1 ^{ポツ} ドル (生種子あり)	70ml	30ml	○	
	英音	FC	★	1 ^{ポツ} ドル (生種子あり)	70ml	30ml	○	
	月夜音	FC		1 ^{ポツ} ドル (生種子あり)	70ml	30ml	○	
	サヤムスメ	FC		1 ^{ポツ} ドル (生種子あり)	70ml	30ml	○	
	サヤコマチ	FC		1 ^{ポツ} ドル (生種子あり)	70ml	30ml	○	
	ユキムスメ	FC		1 ^{ポツ} ドル (生種子あり)	70ml	30ml	○	
	サヤタカラ	FC		1 ^{ポツ} ドル (生種子あり)	70ml	30ml	○	
	サヤニシキ	FC		1 ^{ポツ} ドル (生種子あり)	70ml	30ml	—	
	雪音	FC	★	1 ^{ポツ} ドル (生種子あり)	70ml	30ml	○	
エンドウ	華夏絹莢	FC		1 ^{ポツ} ドル	70ml	30ml	—	4～5リットル
	三十日絹莢	FC		1 ^{ポツ} ドル	70ml	30ml	○	
	電光絹莢	FC		1 ^{ポツ} ドル	70ml	30ml	—	
インゲン	ゴールデンランナー	FC		1千粒	—	100粒	—	1千粒X9～12袋 (3粒播きの場合)※1
	ベストオブ キセラ	FC		2千粒	200粒	30ml	○	2千粒X6袋
	ピテナ	FC		2千粒	200粒	30ml	—	
スイートコーン	ピュアホワイト	FC		2千粒	200粒	30ml	○	*露地 4～5リットル 2千粒X6～7袋
	ピュアホワイトSP	FC		2千粒	200粒	30ml	○	
	ミエルコーン84	FC		2千粒	200粒	30ml	—	
	ミエルコーン89	FC		2千粒	200粒	30ml	—	
	スベールコーン グラス	FC		2千粒	200粒	30ml	○	*マルチ 3リットル 2千粒X5～6袋
	ララミープラス138	FC		2千粒	200粒	30ml	—	
	アイダホスイート78	FC		1 ^{ポツ} ドル	—	—	—	
	アイダホスイート88	FC		1 ^{ポツ} ドル	—	—	—	
カボチャ	栗てまり	FC		—	100粒	8ml	—	100粒X5～7袋
	栗天下	FC		500粒	100粒	8ml	—	
	ながちゃん	FC		—	100粒	8ml	—	
	つきみ	FC		500粒	100粒	8ml	—	
	朱里	FC		—	100粒	8ml	—	
	ゆきこ	FC		—	100粒	8ml	—	
	春宴	FC		2dl	20ml	5ml	5千粒	○
ダイコン	春桜舞	FC		2dl	20ml	5ml	5千粒	○
	晩々G	FC		2dl	20ml	5ml	5千粒	○
	晩抽喜太一	FC		2dl	20ml	5ml	5千粒	—
	喜太一	FC		2dl	20ml	5ml	5千粒	—
	夏巡り	FC		2dl	20ml	5ml	5千粒	○
	来夏	FC		2dl	20ml	5ml	5千粒	—
	早生涼太	薬剤粉衣・FC		2dl	20ml	5ml	5千粒	○
	冬待	FC		2dl	20ml	5ml	5千粒	—
	長香太	FC		2dl	20ml	5ml	5千粒	—
	小太りくん	薬剤粉衣		5千粒	500粒	2ml	5千粒	○
	葉根っ子	薬剤粉衣		5千粒	500粒	2ml	5千粒	—
	のりちゃん	FC		2dl	20ml	8ml	—	4デシリットル
コマツナ	あっちゃん	FC		2dl	20ml	8ml	—	
	浜ちゃん	FC		2dl	20ml	8ml	—	
キャベツ	YR晴信	生		—	20ml	2ml	5千粒	—
	YR清美	FC	■	—	20ml	2ml	5千粒	—
	YR初美636	FC		—	20ml	2ml	5千粒	—
レタス	フレアベル	PC		—	—	—	5千粒	—
	フリルアイス	PC		—	—	—	5千粒	—
	ソレイユ	PC		—	—	—	5千粒	—
ホウレンソウ	雪美菜02	FC		3万粒	70ml	30ml	—	○
ニンジン	カーズナルフレッシュ	薬剤粉衣・FC		2dl	20ml	5ml	—	—
ブロッコリー	ドームツリー	生・FC		—	20ml	2ml	5千粒	—

※1 ゴールデンランナーは発芽率がやや低い傾向にあるため、2株確保のため3粒播きを推奨しております。

- 2022年10月現在の品種ラインアップです。
- 種子処理のFCはフィルムコート、PCはベレットコートの略です。
- 種子処理の生および元詰標準の生種子は薬剤処理、種子加工されていない種子です。
- 種子処理は予告なく変更される場合があります。
- エダマメ1^{ポツ}袋以外の種子処理につきましてはご指定いただけません。
- 品種登録欄の★は「登録品種・海外持出禁止(農林水産大臣公示有)」、■は「登録品種」、▲は「品種登録出願中・海外持出禁止(農林水産大臣公示有)」を示します。
- 販売総袋を使用して種子を小分けにし販売する場合には、小分けした種苗業者が種苗法上の表示義務を負うことになりますので、法令を遵守した表示と種子販売をお願いいたします。