

新発売

くりてまり

# 栗てまり

(試作系統名:SQ-022)

100粒元詰 4,906円  
8ml元詰 583円

シール のぼり

着果が安定していて  
果揃い良好なミニカボチャ



抑制栽培にも  
適する!

## 空間を有効利用して栽培!!

(千葉研究農場 2021年)

空きハウスやトンネル支柱を利用した空中栽培の様子です。地面と接しないため、グランドマークがつかず、果揃いの良い果が収穫できます。葉が日陰を作るので、日焼け予防にも効果的です。



- 雌花の着生多く着果が安定、1つる当たり4~5果収穫できる
- 開花後40日程度で収穫できる
- 1果重は400g程度、果形は扁平で果揃いが良好
- 果皮は濃い黒緑色、退色が遅い
- 果肉は濃黄色で鮮やか、肉質はやや粉質で滑らか

### ここに注意!

- 子づる3本仕立て、畝幅3m、株間70cm程度とする
- 着果は10節程度からを目標として、着果節以降は放任とする

### 栽培作型

| 地域               | 作型   | 播種期 定植期 収穫期 |    |    |    |    |    |    |    |     |     |  |  |
|------------------|------|-------------|----|----|----|----|----|----|----|-----|-----|--|--|
|                  |      | 2月          | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 |  |  |
| 北海道<br>東北<br>高冷地 | トンネル |             |    |    |    |    |    |    |    |     |     |  |  |
|                  | 露地   |             |    |    |    |    |    |    |    |     |     |  |  |
| 一般地<br>暖地        | トンネル |             |    |    |    |    |    |    |    |     |     |  |  |
|                  | 露地   |             |    |    |    |    |    |    |    |     |     |  |  |
|                  | 抑制   |             |    |    |    |    |    |    |    |     |     |  |  |

## カボチャの使い分け

| 特性<br>品種 | 果皮色<br>条斑     | 形状           | 果肉          | 草勢          | 成熟日数   | 出荷時期 | 備考                             |
|----------|---------------|--------------|-------------|-------------|--------|------|--------------------------------|
| 栗てまり     | 黒緑色<br>目立たない  | やや扁平         | 濃黄色<br>粉質   | やや旺盛        | 40日    | 普通~遅 | 手のひらサイズのミニカボチャ<br>着果良好         |
| 栗天下      | 黒緑色<br>目立たない  | 甲高の扁円形       | 濃橙黄色<br>強粉質 | やや旺盛        | 40~45日 | 普通~遅 | 食味良好・大玉<br>カット販売に適する           |
| ながちゃん    | 濃緑色<br>暗灰緑の条斑 | 長紡錘形         | 濃黄色<br>やや粉質 | 旺盛          | 50日    | 普通~遅 | 果皮が薄く切りやすい<br>直売所向き品種          |
| つきみ      | 灰白色           | やや<br>甲高の扁円形 | 濃黄色<br>強粉質  | 旺盛          | 45日    | 遅    | 皮のキズ(カサブタ)の発生が少ない<br>大玉になり過ぎない |
| 朱里       | 朱色<br>淡朱色の条斑  | 扁円形          | 鮮橙黄色<br>粘質  | やや<br>おとなしい | 35~40日 | 早    | 色と香りを活かした加工用                   |
| ゆきこ      | 淡緑色<br>灰白色の条斑 | 栗形           | 濃黄色<br>粉質   | やや旺盛        | 40~45日 | 早~普通 | 着果良好で小玉に揃う                     |

おすすめ

くりてんか

# 栗天下

500粒元詰 15,015円  
100粒元詰 3,179円  
8ml元詰 407円

シール のぼり



## 粉質で食味に優れた大玉で、 貯蔵にも向く黒皮品種

- 草勢はやや旺盛だが雌花の着生が良好
- つる伸びが早く、節間はやや長い、葉が大きく展開
- 開花後40～45日程度で収穫できる中早生品種
- 果皮色は黒に近い黒緑で、条斑は目立たない
- 着果が安定し、収量性は良好
- 果形は甲高の扁円形、4～5玉サイズ中心に揃う
- 果肉は濃橙黄色で特に肩部位の果肉が厚い強粉質、糖化がやや遅く、貯蔵後の食味は良好
- 果皮の退色が遅く、貯蔵性に優れる

### ここに注意！

- 節間がやや長く、着果位置がやや遠くなるため畝幅は3.5～4m程度とする
- 子つる2～3本仕立てとして、株間は60～90cm程度とする
- 開花期以降の肥料効きが特に重要であるため、追肥を重視した肥培管理が望ましい

### 栽培作型

| 地域               | 作型   | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 |
|------------------|------|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 北海道<br>東北<br>高冷地 | トンネル |    |    | ●  | ●  | ▲  |    | ■  |    |
|                  | 露地   |    |    | ●  | ●  | ▲  |    | ■  |    |
| 一般地<br>暖地        | トンネル | ●  | ●  | ▲  |    | ■  |    |    |    |
|                  | 露地   |    | ●  | ●  | ▲  |    | ■  |    |    |

## 味が勝負の「栗天下」は、適期収穫が要です!!

収穫適期は果梗を見て判断！

### 収穫適期

果際に細い横割れ線が入る  
コルク化した線が果梗の端から端まで入る



### 適期前

コルク化した線が  
端々まで伸びていない



### 収穫遅れ

コルク化が進みすぎている  
果際が茶色くなる



# ながちゃん

100粒元詰 4,620円  
8ml元詰 517円

シール のぼり



## これでもカボチャ!? 無駄なく使える長首型の 中生多収品種

- 草勢は旺盛で、側枝の発生が多い
- 果実の成熟はじっくりで、収穫までに開花後45日以上を要する
- 長さ40cm前後、重さ2～3kgになるビッグなカボチャ
- 果皮が薄く包丁が入りやすく、とても切りやすい
- 肉付きが均等なのでカット・スライスの歩留まりが高い
- 肉質は粉質で、甘みがあり食味良好

### 栽培作型

| 地域               | 作型   | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 |
|------------------|------|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|
| 北海道<br>東北<br>高冷地 | トンネル |    |    | ●  | ●  | ▲  |    | ■  |    |     |
|                  | 露地   |    |    | ●  | ●  | ▲  |    | ■  |    |     |
| 一般地<br>暖地        | トンネル | ●  | ●  | ▲  |    | ■  |    |    |    |     |
|                  | 露地   |    | ●  | ●  | ▲  |    | ■  |    |    |     |

### 均一な肉厚！



### 用途に合わせて！



# つきみ

500粒元詰 15,015円  
100粒元詰 3,179円  
8ml元詰 407円

のぼり

着果が安定し、玉数が多くとれる  
冬至出荷向け灰白皮品種



着果が安定

- 草勢が旺盛で、葉は大きい
- 雌花着生は良好で、株あたりの着果数が多い
- 開花後45日程度で収穫できる中早生品種
- 果形はやや甲高の扁円形、一果重は1.8〜2.0kg程度で5〜6玉中心に揃う
- 肉質は強粉質で、貯蔵後に甘みが増して食味良好
- 貯蔵中の腐敗果が少なく、貯蔵性に優れる

## ここに注意！

- 草勢がやや強いので多肥による過繁茂に注意する
- 開花後45日を目安に果梗部を確認して、果梗全体にコルク化が進んだ完熟果のみを収穫する
- 粉質が強く、収穫直後は甘みが少なく感じるため、貯蔵して追熟させてから出荷する

## 栽培作型

| 地域               | 作型 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 |
|------------------|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|
| 北海道<br>東北<br>高冷地 | 露地 |    |    |    |    |    |    |    |     |
| 一般地<br>暖地        | 露地 |    |    |    |    |    |    |    |     |

# ほくとな

テスト販売中



- 着果が安定してつくりやすく、食感ホクホクのカボチャ
- 濃緑皮の中大果

# 朱里

あかり

100粒元詰 3,124円  
8ml元詰 407円

色鮮やかな赤皮多収品種！  
スープ・ジュース等の加工にぴったり！！



- 着果が安定してつくりやすく多収
- 開花後35〜40日で収穫できる早生品種
- 一果重は1.6〜1.8kg程度

## 栽培作型

| 地域               | 作型     | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 |
|------------------|--------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|
| 北海道<br>東北<br>高冷地 | トンネル   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |
|                  | 露地     |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |
| 一般地<br>暖地        | 早熟トンネル |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |
|                  | 露地     |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |

# ゆきこ

100粒元詰 2,970円  
8ml元詰 407円

着果性良好！  
栗形の粉質カボチャ！



- 草勢はやや旺盛
- 着果性に優れ、1つ当たり2〜3果着果する
- 開花後40〜45日で収穫できる
- 一果重1.6kg程度の中〜大果になる
- 粉質で食味が優れる

## 栽培作型

| 地域               | 作型     | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 |
|------------------|--------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|
| 北海道<br>東北<br>高冷地 | トンネル   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |
|                  | 露地     |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |
| 一般地<br>暖地        | 早熟トンネル |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |
|                  | 露地     |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |



# ドームツリー

|         |         |
|---------|---------|
| 20ml元詰  | 8,437円  |
| 2ml元詰   | 913円    |
| ペレット5千粒 | 18,942円 |

在圃性が良く、花蕾腐敗しにくい耐寒性に優れる中生品種



## 花蕾腐敗しにくい! 千葉研究農場 2019年12月収穫



- 播種後120日前後で収穫できる中生品種
- 花蕾は濃緑色でなめらかなドーム状となり、変形が遅い
- 花粒が細かく揃い、花蕾腐敗しにくい
- 草姿は半開張性で草勢旺盛、ボリュームのある花蕾を収穫できる
- 耐寒性に優れ、寒さによる花蕾の斑点や脱色が発生しにくい

### ここに注意!

- 排水の悪い畑は、排水溝を作り、堆肥や緑肥などで土づくりを行う
- 肥料切れの場合は、アントシアンが発生しやすいので注意する
- 追肥は定植から3週間前後を目安に行い、草姿の状況を確認しながら必要に応じて2回目以降の追肥を行う

| 栽培作型 |    | ●: 播種期 ▲: 定植期 ■: 収穫期 |    |    |     |     |     |    |    |    |  |  |  |
|------|----|----------------------|----|----|-----|-----|-----|----|----|----|--|--|--|
| 地域   | 作型 | 7月                   | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |  |  |  |
| 一般地  | 露地 |                      | ●  | ▲  |     |     |     | ■  |    |    |  |  |  |
| 暖地   | 露地 |                      | ●  | ▲  |     |     |     | ■  |    |    |  |  |  |

# YR晴信

はるのぶ

|         |         |
|---------|---------|
| 20ml元詰  | 6,501円  |
| 2ml元詰   | 715円    |
| ペレット5千粒 | 13,849円 |



## 肥大性良く、耐病性に優れ 栽培容易な夏秋系キャベツ 加工用に適する

- 外葉はやや濃緑でやや短く、草勢が旺盛で、草姿は立性
- 玉伸び良好で、濃緑で締まり良く、芯は短い
- 萎黄病抵抗性で黒腐病・黒斑細菌病の発生が少なく栽培が容易
- 寒玉系で葉質はやや硬め



揃い性が良好で、  
仕上がりがきれい



芯が短く、  
巻きがきれい

| 栽培作型      |     | 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 |    |    |    |    |    |    |    |    |     |     |     |
|-----------|-----|----------------------------------------|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|-----|-----|
| 地域        | 作型  | 1月                                     | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 北海道       | —   |                                        |    |    |    |    |    |    |    |    |     |     |     |
| 東北<br>高冷地 | —   |                                        |    |    |    |    |    |    |    |    |     |     |     |
| 一般地<br>暖地 | 春まき |                                        |    |    |    |    |    |    |    |    |     |     |     |
|           | 夏まき |                                        |    |    |    |    |    |    |    |    |     |     |     |

# YR清美

きよみ

PVP

農林水産省品種登録 第17953号

|         |         |
|---------|---------|
| 20ml元詰  | 6,501円  |
| 2ml元詰   | 715円    |
| ペレット5千粒 | 13,849円 |

## バーティシリウム萎凋病の発生が少なく、 耐暑性に優れ栽培容易なやわらかキャベツ



- 定植後55～60日程度で収穫できる早生品種
- 耐暑性に優れ、特に高温期の生育が旺盛で球の肥大が良好
- バーティシリウム萎凋病に抵抗性をもつ
- 球内色は鮮やかな黄色で青臭み少ない
- 軟らかな葉質で、甘みがある

| 栽培作型             |     | 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 |    |    |    |    |    |    |    |    |     |     |     |
|------------------|-----|----------------------------------------|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|-----|-----|
| 地域               | 作型  | 1月                                     | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 北海道<br>東北<br>高冷地 | —   |                                        |    |    |    |    |    |    |    |    |     |     |     |
| 一般地<br>暖地        | 春まき |                                        |    |    |    |    |    |    |    |    |     |     |     |
|                  | 夏まき |                                        |    |    |    |    |    |    |    |    |     |     |     |

# YR初美636

はつみ

|         |         |
|---------|---------|
| 20ml元詰  | 6,028円  |
| 2ml元詰   | 715円    |
| ペレット5千粒 | 12,540円 |

## 耐暑性・耐病性に優れる春系キャベツ



- 草姿は半立性、草勢が旺盛で球の肥大が良い
- 葉質は軟らかく、青臭みがなく食味が良い
- 裂球が遅い
- 黒腐病・黒斑細菌病の発生が少なく栽培が容易

| 栽培作型             |     | 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 |    |    |    |    |    |    |    |    |     |     |     |
|------------------|-----|----------------------------------------|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|-----|-----|
| 地域               | 作型  | 1月                                     | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 北海道<br>東北<br>高冷地 | —   |                                        |    |    |    |    |    |    |    |    |     |     |     |
| 一般地              | 春まき |                                        |    |    |    |    |    |    |    |    |     |     |     |
|                  | 夏まき |                                        |    |    |    |    |    |    |    |    |     |     |     |
| 暖地               | 春まき |                                        |    |    |    |    |    |    |    |    |     |     |     |
|                  | 夏まき |                                        |    |    |    |    |    |    |    |    |     |     |     |

※価格は参考小売価格(消費税10%込)です。