

府県向き

トウモロコシ遅播き・二期作用品種のご紹介

中生(RM127)
PI2008

スノーデントおとほ(PI2008)

耐倒伏性に極めて優れる
乾物多収品種西日本地区
限定九州沖縄農業
研究センターと
雪印種苗の共同育成品種!

	1	2	3	4	5
初期生育	★	★	★	★	★
耐倒伏性	★	★	★	★	★
茎葉収量	★	★	★	★	★
子実収量	★	★	★	★	★
こま葉枯病抵抗性	★	★	★	★	★
すす紋病抵抗性	★	★	★	★	★
根腐病抵抗性	★	★	★	★	★
南方さび病	★	★	★	★	★
ワンホープ利用					●

品種特性

- 耐倒伏性に極めて優れる。
- 南方さび病に極強。
- 乾物多収。

播種期

一等地 5月上旬～7月中旬
西南暖地 4月中旬～8月上旬

最適栽植本数

6500本/10a

※高温となる日(最高気温30℃)、または7～8月播種体系でのワンホープ乳剤のご使用は避けください。

フルシーズン用
SH9904

スノーデント王夏

遅播き品種のスーパースター!!!



	1	2	3	4	5
初期生育	★	★	★	★	★
耐倒伏性	★	★	★	★	★
茎葉収量	★	★	★	★	★
子実収量	★	★	★	★	★
こま葉枯病抵抗性	★	★	★	★	★
すす紋病抵抗性	★	★	★	★	★
根腐病抵抗性	★	★	★	★	★
南方さび病	★	★	★	★	★
ワンホープ利用					×

品種特性

- 九州では早播きも可能なフルシーズン品種です。
- 特に、二期作や遅播き品種では最多の乾物収量。
- 長稈で大柄、多葉な単交。
- 支根が多く耐倒伏性が極強。
- 高温年に多発するさび病、南方さび病に極強の耐病性品種。すす紋病、こま葉枯病にも強い。

播種期

一等地 5月下旬～7月中旬
西南暖地 4月上旬～8月上旬

利用上の注意点

※ワンホープ乳剤のご使用は避けください。
茎葉処理剤をご利用の際はアルファード乳剤をご使用ください。

最適栽植本数

6500本/10a

晩生(5月播き～二期作利用)
SH2933

スノーデント夏皇

耐倒伏性抜群!ボリューム感のある
草姿で多収を実現!西日本地区
限定

	1	2	3	4	5
初期生育	★	★	★	★	★
耐倒伏性	★	★	★	★	★
茎葉収量	★	★	★	★	★
子実収量	★	★	★	★	★
こま葉枯病抵抗性	★	★	★	★	★
すす紋病抵抗性	★	★	★	★	★
根腐病抵抗性	★	★	★	★	★
南方さび病	★	★	★	★	★
ワンホープ利用					×

品種特性

- ボリューム感のある茎葉型品種。
- 耐倒伏性に極めて優れる。
- 高い乾物収量。
- 従来の遅播き・二期作品種に比べ、サイレージ調製時の排汁が少ない!
- フラビー萎縮病に強い。
(フタテンチビヨコバイの発生頻度が高い場合は発症することがあります)

播種期

西南暖地 5月中旬～8月上旬

最適栽植本数

6500本/10a

利用上の注意点

※ワンホープ乳剤のご使用は避けください。
茎葉処理剤をご利用の際はアルファード乳剤をご使用ください。二期作専用品種
SH5937

スノーデント夏空W

フラビー萎縮病に勝つ!!!



	1	2	3	4	5
初期生育	★	★	★	★	★
耐倒伏性	★	★	★	★	★
茎葉収量	★	★	★	★	★
子実収量	★	★	★	★	★
こま葉枯病抵抗性	★	★	★	★	★
すす紋病抵抗性	★	★	★	★	★
根腐病抵抗性	★	★	★	★	★
南方さび病	★	★	★	★	★
ワンホープ利用					●

品種特性

- フラビー萎縮病に最も強い。
(フタテンチビヨコバイの発生頻度が高い場合は発症することがあります)
- 二期作専用品種。
- 南方さび病に極強。すす紋病、こま葉枯病にも強い。

播種期

西南暖地 7月上旬～8月上旬

最適栽植本数

6000本/10a



雪印種苗株式会社

〒004-8531 札幌市厚別区上野幌1条5丁目1番8号 ☎(011)891-5911(代)・FAX(011)891-5774

http://www.snowseed.co.jp/index.html

E-mail: Inquire@snowseed.co.jp

お問い合わせ 北海道研究農場 ☎(0123)84-2121 FAX(0123)82-6101

購読中止・

住所変更など 北海道統括支店 ☎(0155)62-7550 FAX(0155)62-4455