耐病性・耐倒伏性・多収性に優れた スノーデント系のご紹介

府県向け

耐倒伏性・耐病性に優れる！　稔実良好、雌穂が多収！

ニューデント105(LG2533)

【特性】
・子実割合が多く、高TDNサイレージが期待できる。
・ごま葉枯病・すす紋病抵抗性に優れる。病害多発地帯に適する。
・耐倒伏性に優れる。
【適応地帯と播種期】
・東北北部・寒冷地：５月上～中旬
・東北中部・南　部：４月下～５月上旬
【最適栽植本数】　7,500本/10a

耐病性に優れ、110日並の栄養収量を確保！

LG3490 ※旧スノーデント108

【特性】
・初期生育に優れる。
・ごま葉枯病・すす紋病抵抗性に優れる。
・耐倒伏性に優れる。
・早熟な雌穂と茎葉のバランスが良い。
【適応地帯と播種期】
・東北地方はニューデント105に準ずる。
・一　般　地：４月中～下旬　二期作の早播きに適する。
・西南暖地：４月上～中旬
【最適栽植本数】　7,000～7,500本/10a

長稈で茎葉ボリュームに富む多収品種！

スノーデント®110(LG30500)

【特徴】
・長稈で、茎葉ボリュームあり、乾物多収。
・ごま葉枯病、すす紋病抵抗性に優れる。
【適応地帯と播種期】
・東北北部・寒冷地：５月上～下旬
・東北中部・南　部：４月下～５月下旬
・一　般　地：４月中～下旬
・西南暖地：４月上～中旬
【最適栽植本数】7,000～7,500本/10a

耐病性・耐倒伏性に優れ、乾物多収！

スノーデント®115ポラリス(SM8446)

【特性】
・ごま葉枯病、すす紋病抵抗性に優れる。
・支根が多く、根張りが良好、耐倒伏性に優れる。
・茎葉ボリュームがあり、乾物多収。
【適応地帯と播種期】
・東北北部・寒冷地：５月上～下旬
・東北中部・南　部：４月下～６月上旬
・一　般　地：４月中～５月上旬
・西南暖地：４月上～下旬
【最適栽植本数】　7,000～7,500本/10a

品種名が商品名と異なる場合は、商品名の後ろに書かれている（　）内に品種名を記載しています。

耐病性・耐倒伏性・多収性に優れた スノーデント系のご紹介

府県向け

大きな雌穂で高TDNサイレージ作りを！

スノーデント®115(SH4681)

【特性】
・長稈だが、着雌穂高が低く、安定した草姿。
・大きな雌穂の子実型品種。
・耐病性に優れた子実型品種。
【適応地帯と播種期】
・スノーデント115ポラリスに準ずる。
【最適栽植本数】 6,500～7,000本/10a

耐病性に優れ、大きな雌穂が高TDNサイレージ向け！

スノーデント®118S(SH3786)

【特性】
・ごま葉枯病・すす紋病抵抗性に優れる。
・大きな雌穂で、高TDNサイレージを確保。
【適応地帯と播種期】
・東北北部・寒冷地：５月上～中旬
・東北中部・南　部：４月下～６月上旬
・一　般　地：４月中～５月中旬
【最適栽植本数】 6,500本/10a
粗植栽培で雌穂を大きくします。

耐病性・耐倒伏性が優れる！

スノーデント®118R(SH5702)

【特性】
・すす紋病、ごま葉枯病抵抗性に優れる。
・雌雄乾物収量が安定多収な子実型の品種。
【適応地帯と播種期】
・東北北部・寒高冷地：５月上～中旬
・東北中部・南　　部：４月下旬～６月上旬
・一　般　地：４月中旬～５月下旬
・西南暖地：４月上旬～４月下旬
【最適栽植本数】 7,000～7,500本/10a

耐病性が優れる茎葉多収品種！

スノーデント®122レオ(SM8490)

【特性】
・ごま葉枯病・すす紋病抵抗性に優れる。
・ボリューム感があり、茎葉多収型品種。
・耐倒伏性に優れる。
【適応地帯と播種期】
・東北中部・南　部：４月下～６月上旬
・一　般　地：４月中～６月上旬
・西南暖地：４月上～下旬
【最適栽植本数】 6,000～6,500本/10a

品種名が商品名と異なる場合は、商品名の後ろに書かれている（　）内に品種名を記載しています。

耐病性・耐倒伏性・多収性に優れたスノーデント系のご紹介

府県向け

大きな雌穂の乾物多収中生品種 !!

スノーデント®SH4812(SH4812)

【特性】
・初期生育良好。
・ボリューム感のある大型品種。
・大きな雌穂の乾物多収品種。
【適応地帯と播種期】
・東北中部・南部：４月下～６月上旬
・一　般　地：４月中～６月上旬
・西南暖地：４月上～５月上旬
【最適栽植本数】　6, 000～6, 500本/10a
※大柄な品種のため、畦間、株間は広めがお薦めです。

耐病性に優れ、総体乾物収量が高い大型中生品種！

スノーデント®125T(SH2821)

【特性】
・ごま葉枯病・すす紋病抵抗性に優れる。
・乾物多収の中生品種。
【適応地帯と播種期】
・東北中部・南　部：４月下～６月上旬
・一　般　地：４月中～６月上旬
・西南暖地：４月上～５月中旬
【最適栽植本数】　6, 500～7, 000本/10a

耐倒伏性に優れた乾物多収品種！

スノーデント®おとは(PI2008) PVP

【特性】
・耐倒伏性に優れる。
・ごま葉枯病・南方さび病抵抗性に優れる。
・乾物多収なサイレージ用品種。
【適応地帯と播種期】
・一　般　地：５月上～７月中旬
・西南暖地：４月中～８月上旬
【最適栽植本数】　6, 500本/10a
注）高温となる日(最高気温30℃以上)、または７～８月播種体系でのワンホープ乳剤のご使用はお避けください。

ワラビー萎縮症抵抗性に優れ、耐倒伏性に優れる！

スノーデント®夏皇®(SH2933)

【特性】
・ボリューム感のある茎葉型品種。
・耐倒伏性に優れる。
・高い乾物収量。
・ワラビー萎縮症抵抗性に優れる。
【適応地帯と播種期】
・西南暖地：５月中旬～８月上旬
【最適栽植本数】　6, 500本/10a
注）ワンホープ乳剤は使えないため、アルファード液剤をご利用ください。

品種名が商品名と異なる場合は、商品名の後ろに書かれている（　）内に品種名を記載しています。