

パールミレット

ネマレット (ADR300)

品種名: ADR300

極早生

新発売

規格

1kg/袋


20kg/袋

ソルガム類の生育が悪い…雑草に負けてしまった…そんな方におススメの新品種！
夏場の高タンパク粗飼料確保に！アブラムシが付きにくい！



ネマレットの生育特性と栽培のポイント

- ◆発芽・生育が早く、播種後50～60日前後で出穂します。
- ◆茎が柔らかく、青刈り利用に最も適します。水分含量が高いため、サイレージ利用の場合は、開花期以降（出穂始から3週間後以降）の収穫をお勧めします。乳酸菌添加も効果的です。
- ◆収穫後はほとんど再生しないため、再生草は利用できませんが、後作での雑草化の心配がありません。



2カ年平均生草収量（弊社千葉研究農場）※（ ）内は乾物収量

品種特性

- 土壌を選ばず良く生育し、酸性・粘土質土壌などにも適応する。※耐湿性は中程度。
- 短期で高収量を得ることができる。粗タンパクが高く、青刈り・サイレージ利用に適する。
- アブラムシが付きにくく、青刈り利用時の不快感（汚れ）が軽減できる。
- カタネグサレセンチュウを抑制する。

播種期

東北中部・南部	6月上旬～7月上旬
一般地	5月下旬～7月下旬
西南暖地	5月中旬～8月中旬

播種量


3.0kg/10a（散播）、2.0kg（条播）

現地事例紹介

pH4台の酸性かつ粘土質の土壌が広がる奄美群島で、短期間に高収量が確保できることを確認しました（2か月栽培で収量6t/10a）。



ネマレット



スーダングラス 他品種C

播種1ヵ月後の様子（鹿児島県奄美群島現地圃場、2019年）



これも凄い！

ネマレットは「ソルガム類のいや地発生圃場」でも良く生育します。ソルガムの生育が悪い…雑草に負けてしまった…そんな方はネマレットを栽培してみませんか？



ネマレット

弊社・千葉研究農場



ネマレット

弊社・宮崎研究農場

「ソルガム類のいや地発生圃場」での生育（播種1ヵ月後）
生育旺盛がネマレット、その他はソルガム類



雪印種苗株式会社

〒004-8531 札幌市厚別区上野幌1条5丁目1番8号 ☎(011)891-5911(代)・FAX(011)891-5920

<https://www.snowseed.co.jp/>

お問い合わせ
購読中止・住所変更など

北海道研究農場
北海道業務課

☎(0123)84-2121
☎(0155)62-7550

FAX(0123)82-6101
FAX(0155)62-4455

