

カラシナ

辛神

PVP
海外持出禁止
(農林水産大臣公示有)
からじん


農薬低減

辛み成分高含有の品種
土壌病害と線虫による被害を軽減

詳細は本誌10、13ページをご参照ください！

特徴

- 辛み成分（グルコシノレート）を茎葉に多く含み、細断して土壌にすき込むことで、土壌病害と線虫による被害を軽減する。
- 葉が柔らかく、すき込み後の分解が早い。
- 前作の残肥が無い場合は元肥が必要。
(北海道 N：8～10kg/10a、都府県 N：0～8 kg/10a)



すき込むタイミングは・・・

着蕾～開花始

この時期は、有効成分である辛味成分が葉茎に多く含まれます。


下記の土壌病害虫による被害を軽減します




コムギ
立枯病




ジャガイモ
黒あざ病



テンサイ
根腐病




サツマイモ
紫紋羽病
サツマイモネコブ
センチュウ害
※越冬栽培時のみ



ネギ
黒腐菌核病



ホウレンソウ
萎凋病



トマト
青枯病

第71巻第3号（通巻701号）

牧草と園芸/2023年5月 初夏号（令和5年5月1日発行） 目次

□カラシナ「辛神」のご紹介/目次	表2
□土着天敵の保護・強化における緑肥作物の活用	[大井田 寛] 1
□緑肥と硝酸化成抑制材入り肥料を組み合わせた秋作ブロッコリーの減化学肥料栽培	[五十嵐総一] 5
□北海道向け 緑肥作物のご紹介	[小鹿なつめ、辻本 泰地] 9
□都府県向け 緑肥作物のご紹介	[宮城 果奈] 13
□はじめての緑肥栽培（都府県）	[小川 拓也] 16
□パールミレット「ネマレット」のご紹介	表3
□エダマメ「青祭」のご紹介	表4



備中国分寺のレンゲ
(岡山県総社市)