

夏バテを防ぎ
乳量を高める

根 菜 類

家畜ビート

多汁で糖分含量多く、乳牛は好食し乳量を高めてくれます。またビタミン・カロチンを含み健康的で、夏バテを防ぎます。

早春に播種すれば、7～8月頃に約10^トの根部が得られ、きわめて 収な作物です。

●バーレス(橙色)……早生型早太り種。

比較的ヤセ地でも多収。
〈7月上旬～8月中旬収かく〉



●ハーフェロー(黄色)……中熟型。関東以南暖地の適品種。多収。

〈7月上旬～8月下旬収かく〉

●M・G・M(桃色)……晩熟型。耐病性。砂糖ビートとの交配種で含糖率高い。〈7月中旬～9月上旬収かく〉

家畜ビート多収栽培の要点

1. 早春〈3月上旬〉に播種する。
(ペーパーポットを使えば1月早く〈2月上旬〉播種でき、30%～40%増収されます。)
2. 施肥量は堆肥3～5^ト、石灰300^キ、窒素10^キ、リン酸15^キ、カリ5^キ。
3. 播種量10⁷分当り1^キ(ペーパーポットでは0.3^キ)
4. 畦幅60^{センチ}×株間25^{センチ}1本立
間引は本葉2～3枚のころ
5. 播種2ヵ月頃から病虫害防除にクプラビットとBHCを2～3回散布。

家畜かぶ

春まき夏収かく

春に播種し、60～70日で5^トの収穫ができます。どこにでも簡単に栽培され、短期間に生育します。品種は

●雪印改良紫丸かぶ ……抽苔(とう立ち)の心配なく早太り、厚肉多収品種。

エンシレージ用 一代雑種デントコーン

一代雑種(F₁)デントコーンは、生育良く子実生産量多く、良質で栄養価高いエンシレージを調整できます。

最も良質のエンシレージは、実が乳熟～黄熟期に達したものを詰込む場合に得られます。後作のことも考え、品種をお選び下さい。

品 種	早晩生	特 性
交1号 (長交227号) 長交 161号 交3号 (TC5号)	極 晩 中生の晩 中生の早	茎葉の繁茂が旺盛、伸長巨大型、青刈収量極めて多い。 青刈収量、子実収量ともに多い。 子実収量多く、倒伏に強い。機械刈取(ハーベスター)に適す。 また後作「カブ」の作付にも好適。
参考 ホワイト (白色種) エロー (黄色種)	晩 中	茎葉の繁茂が旺盛で、青刈収量多い。 サイレージに適する中生種。

◎ 水田前作など、短期間に青刈利用できる 雪印育成の大葉多葉性ひまわり

◎ 酪農家の人気者、1個40～50^キにもなる 家畜カボチャ・マンモスポンキン