

秋まき飼料作物一覽表

() 内優良適品種

区分	用途	利用	適 作 物					
			積雪寒冷地		中間地		暖地	
			まめ科	いね科	まめ科	いね科	まめ科	いね科
牧草類	集約採草地用	青刈・乾草サイレージ	赤クローバ (ハミドリ) ルーサン (デュビュイ) ラデノクローバ アルサイクローバ (テトラ)	オーチャード (ヘイキング、フロード) チモシー (ホクオウ、クライマックス) H・ワンライ ケンタッキー31フェスク メドウフェスク (レトー) マウンテンブROOMグラス	赤クローバ (ハミドリ) ケンランド ルーサン (デュビュイ) ウイリアムス ラデノクローバ アルサイクローバ (テトラ)	オーチャード (ヘイキング、フロード) イタリアンライ(マンモスA) H・ワンライ ケンタッキー31フェスク マウンテンブROOMグラス トルオートグラス	赤クローバ (ケンランド) ベンスコット ルーサン (デュビュイ) ウイリアムス ラデノクローバ	オーチャード (ヘイキング、ポトマック) イタリアンライ(マンモスA) H・ワンライ ケンタッキー31フェスク トルオートグラス マウンテンブROOMグラス ダリスグラス
	集約放牧地用	放 牧	白クローバ (ニュージランド) ラデノクローバ ルーサン (ライゾーマ)	オーチャード(フィロックス) ベレニアルライ(マンモス) H・ワンライ メドウフェスク ケンタッキーブルーグラス	白クローバ (ニュージランド) ラデノクローバ ルーサン (ライゾーマ)	オーチャード (ヘイキング、ポトマック) イタリアンライ(マンモスB) ベレニアルライ(マンモス) H・ワンライ ケンタッキーブルーグラス	白クローバ (ニュージランド) ラデノクローバ ルーサン (ライゾーマ)	オーチャード (ヘイキング、ポトマック) イタリアンライ(マンモスA) ベレニアルライ(マンモス) H・ワンライ ケンタッキーブルーグラス パーミューダグラス バヒヤグラス
	牧野造成用	放牧、乾草	赤クローバ (ハミドリ) 白クローバ (ニュージランド) バーツフット	オーチャード(フィロックス) チモシー (ホクオウ、クライマックス) ケンタッキー31フェスク メドウフェスク スムズブROOMグラス レッドトップ ケンタッキーブルーグラス	赤クローバ (ハミドリ) ケンランド 白クローバ (ニュージランド) バーツフット	オーチャード (ヘイキング、フロード) ケンタッキー31フェスク スムズブROOMグラス レッドトップ ケンタッキーブルーグラス レッドフェスク	赤クローバ (ケンランド) 白クローバ (ニュージランド) バーツフット	オーチャード (ヘイキング、ポトマック) ケンタッキー31フェスク、 スムズブROOMグラス、 レッドトップ、 レッドフェスク ダリスグラス、バヒヤグラス パーミューダグラス
	短年草地用	青刈、乾草サイレージ			赤クローバ (ケンランド) ベンスコット クリムソクローバ	イタリアンライ(マンモスB) H・ワンライ	赤クローバ (ケンランド) ベンスコット クリムソクローバ	イタリアンライ(マンモス ^A _B) H・ワンライグラス
	裏作草地用	青刈、乾草サイレージ			赤クローバ (ケンランド) ベンスコット アルサイクローバ (テトラ)	イタリアンライ(マンモス ^A _B)	赤クローバ (ケンランド) ベンスコット アルサイクローバ (テトラ)	イタリアンライ(マンモスA)
青刈類	畑裏作用	青刈サイレージ	ヘアリーベッチ	ライ麦(4倍体)	コモンベッチ	えん麦(豊葉、101号、セブンオート) ライ麦(4倍体)	コモンベッチ れんげ	えん麦(太豊、豊葉、101号、セブンオート) ライ麦(4倍体)
	年内刈用	青刈			コモンベッチ	えん麦(太豊、豊葉、101号、セブンオート) デントコーン(早期水田跡) ソルゴー(")	コモンベッチ	えん麦(太豊、豊葉、101号、セブンオート) ライ麦(4倍体) デントコーン(早期水田跡) ソルゴー(")
根菜葉類	裏作用 多毛作用	生食(貯蔵)	紫丸かぶ(雪印改良) 小岩井かぶ(雪印改良)、レーブ		紫丸かぶ(雪印改良) 下総かぶ(雪印改良)、レーブ		紫丸かぶ(雪印改良)、セブントップ 下総かぶ(雪印改良)、レーブ	

(註) ・バヒヤグラス、ダリスグラス、パーミューダグラスの秋まきは西南暖地に限り、8月中～下旬播種。
・積雪寒冷地における牧草類の秋まきは、8月中旬までに播いた方が安全です。

