

# 牧草と園藝



8

雪印種苗株式會社

# 暖地トウモロコシ収穫のポイント

- 1) 適期収穫……畑の外側でなく内側の株の雌穂をみて、黄熟に達したときが適期です。表参考。
- 2) 水分調節……若刈りすると、排汁が多く酪酸発酵になりやすいので、水分70%位が適当です。逆に過熟乾きすぎも二次発酵になりやすい。
- 3) 切断長は……サイレージ調製面からは1cmがよいとされていますが、牛のためには1.7cm程度がよい。
- 4) サイロ詰……詰込みの際、空気を排除して踏圧、密封、加重に注意します。

## ◎播種期と収穫時期のめやす

(関東中央部基準)

○……播種期    ×……収穫期    数字……10a当たり標準収量

3 月	4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	10 月	11 月
	○				×5トン			
	○				×6トン			
	○				×6.5トン			
	○				×7トン			
スノーデントA号, パイオニアA号	○				×5トン			
スノーデント1号, パイオニア1号	○				×6トン			
スノーデント2号, パイオニア2号	○				×6.5トン			
スノーデント3号, パイオニア3号	○				×7トン			
スノーデントA号, パイオニアA号	○				×4.5トン			
スノーデント1号, パイオニア1号	○				×5.5トン			
スノーデント2号, パイオニア2号	○				×6トン			
スノーデント3号, パイオニア3号	○				×6.5トン			
スノーデントA号, パイオニアA号		○			×4トン			
スノーデント1号, パイオニア1号		○			×5トン			
スノーデント2号, パイオニア2号		○			×5.5トン			
スノーデント3号, パイオニア3号		○			×6トン			
スノーデントA号, パイオニアA号			○		×4トン			
スノーデント1号, パイオニア1号			○		○			黄熟期に達せず
スノーデント2号, パイオニア2号			○		○			
スノーデント3号, パイオニア3号			○		○			
			○		○			

注) 上表は関東中央部を基準とした例で、地域天候により収穫期は7～10日位前後します。

## ◎トウモロコシの熟度の見分け方 (一般に早刈り傾向にあります)

**乳熟期**：子実を押すとミルク状の液体がでる。

**糊熟期**：生食適期の状態で、子実の内部は糊状を呈している。

**黄熟期**：子実の頂部が凹み、爪でカパッと割れる状態になる。完熟(成熟)期の少し前。