

- ◆極早生品種で生育出穂が早く，耐病性が強い。
- ◆短稈・直立型で倒伏に強く，機械刈に適する。

トウモロコシ後作のホープ!

極早生エンバク

ハヤテ

疾風

ハヤテ栽培のポイント

1. 播種期…関東では8月下旬～9月上旬
…西南暖地では9月上旬～中旬
2. 播種量
畦幅50cm条播……5～7kg / 10a
散播(バラ播き)…7～10kg / 10a
3. 施肥量(例)
チッソ10kg, リン酸15kg, カリ8kg
(各成分量)



各地におけるハヤテの栽培利用例

●サイレージ用

千葉市周辺酪農家23戸の事例

- (1) 播種期 8月24日～9月12日
(約6割が9月1日から3日まで)
- (2) 播種量 条播(6戸) 10a当たり平均 7kg
散播(17戸) " 7.8kg
- (3) 収穫日 12月25日から30日の間

表1 エンバクのサイレージ品質 (昭55)

酪農家	項目						フリーク評点
	水分	pH	乳酸	酢酸	酪酸		
	%		%	%	%		
A	79.6	3.9	2.44	0.57	0		98
B	74.2	4.6	2.27	1.38	0		74
C	72.4	4.5	3.25	0.64	0		99
D	59.4	5.4	3.69	1.34	0		91

注) 千葉県畜産センター分析

●立毛乾草利用

静岡畜試周辺の事例

表2 オオムギ，エンバク播種期，刈り取り日

作物	品種	試験地	標高(m)	播種日	刈り取り月日	刈り取り時熟期
エンバク	ハヤテ	静岡畜試	635	9.16	12.15	穂バラミ
	ハヤテ	村山	500	9.16	12.30	出穂期
	ハヤテ	外神	150	9.9	12.30	乳熟期
2条オオムギ	アズマゴールデン	静岡畜試	635	9.16	12.15	穂バラミ

注) 表2, 図1 昭55, 静岡畜試の成績より抜粋




図1 オオムギ，エンバクの立毛乾草収量成績