

# 牧草と園藝



10

1989

# 地域・用途別草地混播例と播種量

	採草地	兼用草地	放牧地
寒地	チモシー(ホクオウ) 2.0	オーチャードグラス(キタドリ) 1.5	オーチャードグラス(キタドリ) 2.0
	メドーフェスク(ファースト) 0.5	チモシー(ホクオウ) 0.5	ペレニアルライグラス(フレンド) 0.5
	アカクローバ(ハミドリ) 0.7	メドーフェスク(ファースト) 0.5	メドーフェスク(ファースト) 0.5
	シロクローバ(カリフォルニア) 0.3	ペレニアルライグラス(フレンド) 0.3	ケンタッキーブルー(トロイ) 0.5
	計(10アール分) 3.5kg	アカクローバ(ハミドリ) 0.5	シロクローバ(フィア) 0.5
	シロクローバ(カリフォルニア) 0.2	計(10アール分) 4.0kg	
	計(10アール分) 3.5kg		
寒冷地	オーチャードグラス(ナツミドリ) 2.0	オーチャードグラス(ナツミドリ) 1.5	オーチャードグラス(ナツミドリ) 2.0
	メドーフェスク(ファースト) 0.5	メドーフェスク(ファースト) 0.5	ペレニアルライグラス(フレンド) 0.5
	ハイブリッドライ(テトリライト) 0.3	ペレニアルライグラス(フレンド) 0.5	メドーフェスク(ファースト) 0.5
	アカクローバ(ハミドリ) 0.5	ケンタッキーブルー(トロイ) 0.3	ケンタッキーブルー(トロイ) 0.5
	シロクローバ(カリフォルニア) 0.2	アカクローバ(ハミドリ) 0.5	ケンタッキーブルー(トロイ) 0.5
計(10アール分) 3.5kg	シロクローバ(カリフォルニア) 0.2	シロクローバ(フィア) 0.5	
	計(10アール分) 3.5kg	計(10アール分) 4.0kg	
温暖地	オーチャードグラス(ナツミドリ) 2.5	オーチャードグラス(ナツミドリ) 2.0	オーチャードグラス(ナツミドリ) 2.0
	イタリアンライグラス(エース) 0.3	イタリアンライグラス(エース) 0.3	ペレニアルライグラス(フレンド) 1.0
	アカクローバ(ケンランド) 0.5	ケンタッキーブルー(トロイ) 0.5	ケンタッキーブルー(トロイ) 0.5
	シロクローバ(カリフォルニア) 0.2	アカクローバ(ケンランド) 0.5	シロクローバ(フィア) 0.5
	計(10アール分) 3.5kg	シロクローバ(カリフォルニア) 0.2	計(10アール分) 4.0kg
	計(10アール分) 3.5kg		
暖地	トールフェスク(サザンクロス) 1.5	トールフェスク(サザンクロス) 1.5	トールフェスク(サザンクロス) 2.0
	オーチャードグラス(ナツミドリ) 1.0	オーチャードグラス(ナツミドリ) 0.5	オーチャードグラス(ナツミドリ) 1.0
	イタリアンライグラス(エース) 0.3	イタリアンライグラス(エース) 0.3	ケンタッキーブルー(トロイ) 0.5
	アカクローバ(ケンランド) 0.5	ケンタッキーブルー(トロイ) 0.5	ケンタッキーブルー(トロイ) 0.5
	シロクローバ(カリフォルニア) 0.2	アカクローバ(ケンランド) 0.5	シロクローバ(フィア) 0.5
計(10アール分) 3.5kg	シロクローバ(カリフォルニア) 0.2	計(10アール分) 4.0kg	
	計(10アール分) 3.5kg		
亜熱帯	1年目(8月~9月上旬播種)		
	バヒアグラス.....3.0キロ		
	2年目以降に毎年追播(9月下旬~10月下旬)		
	イタリアンライグラス(サクラワセ).....3.0キロ		
シロクローバ(フィア).....0.5キロ			
計(10アール分) 3.5キロ			

(注)地域区分は年平均気温で行い、寒地:8℃以下、寒冷地:8~12℃、温暖地:12~14℃、暖地:14~16℃、亜熱帯:16℃以上とする。