

# 牧草と園藝

8

1992

# 雪印種苗育成・イタリアンライグラスの

## 品種選定ガイド

### サクラワセ

極早生・極短期利用型

#### 早播きトウモロコシ、早期水稲の前作に最適

- 細茎で出穂茎が多く、乾物率が高いため、サイレージ・乾草調製に好適。
- 収穫後の残株・残根量が少なく、後作の耕起・播種作業や稲の活着への影響が少ない。

### タチワセ

早生・短期利用型

#### トウモロコシ、ソルガムの前作に適する

- 直立型で葉が上向きのアップライトリーフタイプ。短期多収品種。
- 耐倒伏性が抜群に強く、機械刈りに適し、予乾効率が良いので、サイレージ・乾草利用に最適。

新品種

### タチマサリ

早生・短期利用型

#### トウモロコシ、ソルガムの前作に適する

- 生育旺盛で、草丈高く、大型の短期多収品種。
- 倒伏に強く、利用しやすいサイレージ・乾草利用向き品種。

### マンモスイタリアンB

中晩生・中期利用型

#### ソルガム、暖地型牧草の前作に適する

- 四倍体の中晩生品種で、1~2回利用で極多収。
- 春播きでも出穂茎多く、秋作エンバクや飼料カブの後作としても好適。

### エース

晩生・長期~周年利用型

#### ソルガム晩播きの前作や草地での周年栽培に適する

- 耐暑性・越夏性が良好で、標高の高い地域では2~3年利用が可能。
- 西南暖地の早播きで発生が多いもち病に強く、冠さび病にも極強。
- 耐寒性・耐雪性も強く、積雪地帯でも安心して栽培できる。

## イタリアンライグラス 品種特性一覧表

◎…良または適 ○…やや良 △…中 ×…不良または不適

| 品 種 名                            | 利用型        | 早晩性 | 越夏性 |      | 耐寒性 | 冠抵抗性 | 利用法 |       |    | 春播利用性 | 倍数性 |     |
|----------------------------------|------------|-----|-----|------|-----|------|-----|-------|----|-------|-----|-----|
|                                  |            |     | 温暖地 | 西南暖地 |     |      | 青刈  | サイレージ | 乾草 |       |     |     |
| 雪印種苗育成品種                         | サクラワセ      | 極短期 | 極早生 | ×    | ×   | △    | △   | △     | ◎  | ◎     | ○   | 2倍体 |
|                                  | タチワセ       | 短期  | 早生  | ×    | ×   | △    | △   | ○     | ◎  | ◎     | ○   | 2倍体 |
|                                  | タチマサリ      | 短期  | 早生  | ×    | ×   | △    | △   | ○     | ◎  | ◎     | ○   | 2倍体 |
|                                  | マンモスイタリアンB | 中期  | 中晩生 | △    | ×   | ○    | ○   | ◎     | ◎  | ○     | ◎   | 4倍体 |
|                                  | エース        | 極長期 | 晩生  | ◎    | ○   | ◎    | ◎   | ◎     | ○  | ○     | △   | 4倍体 |
| テトリライト<br>(ハイブリッドライ)<br>普通種(コモン) | 極長期        | 晩生  | ◎   | △    | ◎   | ○    | ○   | ○     | ○  | △     | 4倍体 |     |
|                                  | 短期         | 中生  | ×   | ×    | ×   | △    | ○   | ○     | ○  | ○     | 2倍体 |     |
| 公的育成品種                           | ミナミアオバ     | 極短期 | 極早生 | ×    | ×   | ×    | ○   | △     | ◎  | ◎     | ○   | 2倍体 |
|                                  | ミナミワセ      | 極短期 | 極早生 | ×    | ×   | ×    | △   | △     | ◎  | ◎     | ○   | 2倍体 |
|                                  | ワセアオバ      | 短期  | 早生  | ×    | ×   | △    | △   | ○     | ◎  | ◎     | ○   | 2倍体 |
|                                  | ワセユタカ      | 短期  | 早生  | ×    | ×   | △    | △   | ○     | ◎  | ◎     | ○   | 2倍体 |
|                                  | ミュキアオバ     | 短期  | 早生  | ×    | ×   | ◎    | △   | ○     | ○  | ○     | ○   | 4倍体 |
|                                  | フタハル       | 極長期 | 晩生  | ◎    | ○   | ◎    | ◎   | ◎     | ○  | ○     | △   | 4倍体 |