

植物生理活性物質

今年も元気な作物を育てるために…

スノーグローエース



効果

- 根量が増えます。
- 乾物重が増え、強固な苗が作れます。
(トマト育苗利用…平成3年北海道指導参考事項)

使用方法

馬鈴しょ	使用時期	本葉展開期(3~5葉)		着蕾期~開花初期	
	使用量	100g/水100ℓ/10a		100g/水100ℓ/10a	
てんさい	使用時期	子葉展開期	定植2~3日前	移植後30~45日(6月中旬)	糖分蓄積盛期(8月上・中旬)
	使用量	(1号ポット約30冊分) 25g/水10ℓ/10㎡	(1号ポット約30冊分) 25g/水10ℓ/10㎡	125g/水100ℓ/10a	125g/水100ℓ/10a
たまねぎ	使用時期	播種期	移植2~3日前	本葉6~7葉期	球肥大期
	使用量	25g/水10ℓ/10㎡	25g/水10ℓ/10㎡	100g/水100ℓ/10a	125g/水100ℓ/10a
にんにく	使用時期	植付前浸漬	茎葉伸長期 (4月上~下旬)	りん片形成期 (5月上~中旬)	球肥大期 (6月上~6月中旬)
	使用量	300倍3時間	100~200g/ 水100ℓ/10a	100~200g/ 水100ℓ/10a	100~200g/ 水100ℓ1~2回/10a
ながいも	使用時期	主茎伸長期(6月下~7月上旬)		いも肥大始期(8月上中旬)	いも肥大最盛期(8月下旬)
	使用量	100g/水100ℓ/10a		250g/水200~300ℓ/10a	250g/水200~300ℓ/10a
ごぼう	使用時期	本葉5~6葉期		根肥大初期	
	使用量	125g/水100ℓ/10a		125g/水100ℓ/10a	
トマト	使用時期	本葉3~5葉期(鉢上げ時)	定植10日前	定植後20~30日	収穫期(10~14日ごと)
	使用量	3g/水3ℓ/㎡	3g/水3ℓ/㎡	150g/水100ℓ/10a	150g/水100ℓ/10a
きゅうり	使用時期	本葉2~3葉期	定植10日前	定植後15~30日	収穫期(10~14日ごと)
	使用量	3g/水3ℓ/㎡	3g/水3ℓ/㎡	150g/水100ℓ/10a	150g/水100ℓ/10a
水稻(育苗期)	使用時期	播種前播種浸漬	出芽後7日ごろ		移植2~3日前
	使用量	300倍液24時間浸漬	(水稻用育苗箱約200枚分) 100g/水50ℓ		(水稻用育苗箱約200枚分) 100g/水50ℓ

使用上の注意

- 散布に際しては展着剤をご使用ください。
- 農薬との混用散布はできませんが、強力カリ性、鎖剤ホルモン系農薬との混用はできません。
- 調製した散布液はそのまま放置せず、その日のうちに使用ください。

※その他、メロン、はくさい、キャベツ、ブロッコリー、さといも、いちご、豆類などに使用し効果があります。
くわしくは、パンフレットをご参照ください。



栽培・新・技術

植物ホルモンに関しては、この一冊でOK!
作物の収量・品質向上への期待

「サイトカニン バイブル」

頒価2,000円