

イネ科牧草地のギシギシ退治に

新除草剤
(適用拡大)

バンベル-D液剤

特 長

- **殺草力が強力**
茎葉ホルモン型除草剤で、ギシギシの根まで枯らします。
- **選択殺草性**
イネ科牧草には薬害なく安全で、ギシギシ他広葉雑草を選択的に殺草します。
- **毒性が低く、安全で使いやすい**
人畜毒性は普通物、魚毒性はA類で安全性が高い除草剤です。
- **効果の発現が早い**
散布後数日で捻転症状が現われ、1～2週間で枯死します。

適用雑草の範囲と使用方法

作物名・ 適用場所	適用雑草名	使用時期	10アール当たり使用量		本剤及びMADP を含む農薬の 総使用回数	使用 方法
			薬量 (mℓ)	希釈水量 (ℓ)		
牧野・草地	ギシギシ	秋期最終刈り後 30日以内	75～100	100	1回	雑草 茎葉散布

使用上の注意点

- マメ科牧草には薬害を生じるので、マメ科牧草優占草地での使用は避ける。
- 秋期最終刈り後30日以内までに散布してから1番刈りの間は放牧及び採草をしないこと。
- 牧草以外の有用な植物や樹木の近くでは薬害の恐れがあるので使用しない。
- その他、使用に当たっては説明書を良く読み、特に初めて使用する場合には指導機関等に相談のうえ、使用方法を誤らないよう注意して下さい。