


# ホル子牛・F1子牛兼用代用乳

進化

# つよくん



すこやかな子牛の成長をねがって、さらに効率アップ!  
当社人工乳と合わせてご利用下さい。

## 特長

1. 溶けやすさはそのままに、サラサラ感を充実させました。
2. 消化吸収性の良い中鎖脂肪酸( MCT )の強化で、より母乳に近づきました。
3. 子牛が消化吸収しやすい新大豆たんぱく原料を配合しました。
4. 子牛の腸内微生物を整えるために、ガラクトオリゴ糖とトヨイ菌を配合しています。ガラクトオリゴ糖の利用技術は、雪印グループの共同研究の成果です。

全乳からの切り替えは、即日全量切り替えてもかまいません。

1日2回、1回200g( 2週齢時 )~ 250gを1.2~ 2ℓのお湯に溶かして下さい。

溶かすときは、45~ 50℃のお湯( 冬季及び寒冷地では48~ 55℃ )に「つよくん」を入れてよくかくはんして下さい。子牛へ給与する時の適温は約40℃。

離乳の目安は35日齢( 導入雄子牛では4週間 )ですが、人工乳を800g / 日以上採食するようになった時点で離乳可能です。ただし、食の細い子牛や虚弱な子牛は1日1回の哺乳を継続して下さい。その後の発育が順調となります。

40kg以下の子牛や虚弱な子牛は、「つよくん」の給与量を標準より1日50~ 100g減量して下さい。下痢の発生が少なくなります。

F1子牛への「つよくん」の給与量は、標準より1日50~ 100g減量して下さい。

## 給与方法

## 保証成分

たんぱく質 (%以上)	粗脂肪 (%以上)	粗繊維 (%以下)	粗灰分 (%以下)	カルシウム (%以上)	リン (%以上)	DCP (%以上)	TDN (%以上)
26.5	20.0	1.0	10.0	0.70	0.60	24.0	112.0

## 給与プログラム

出生	7日齢	14日齢	35日齢	90日齢
初乳 4~5ℓ/日	つよくん 400g/日		つよくん 500g/日	
	粗飼料入り人工乳 スターター・乾草給与			
自由飲水				

## 標準給与量

週齢	1回の給与量	お湯の量
2	200g	1.2~ 1.6ℓ
3	250g	1.5~ 2.0ℓ
4	250g	1.5~ 2.0ℓ
5	250g	1.5~ 2.0ℓ

## 1回哺乳システム のご案内

哺育経費の低減、省力化を実現する新しい哺育システムです。詳しいマニュアルを用意していますので、お気軽に担当者にお問い合わせ下さい。




雪印育成  
**サヤコマチ**  
農林水産省品種登録 申請中  
STEP 1 1ℓ 元詰  
1dl

白毛の中早生種。  
濃緑色の大莢で、着莢数が多い  
サヤムスメの姉妹種。

特 性

移植、早播き栽培ではサヤムスメより収穫が早くなるが、標準播きでは播種後84日(関東標準)で収穫期に達する中早生品種。草姿はサヤムスメに似るが、より小葉で、主茎がやや細い。莢は白毛で濃緑色。サヤムスメ並の大莢でボリュームがあり品質良好。着莢数が多く、上物収量が多い。特に低温時の着莢数が安定している豊産種。

サヤコマチの栽培時期




雪印育成  
**春の舞**  
農林水産省品種登録8284号  
STEP 1 1ℓ 元詰  
1dl

白毛の極早生種。  
ふっくらとした大莢で、3粒莢多く、  
低温着莢性に優れ、食味最高。

特 性

熟期はサッポロミドリより1~2日程度早い極早生種。草丈はサッポロミドリ並みで、草勢はややおとなしくコンパクト。莢はきれいな鮮緑色で、ふっくらとして実入り良好な大莢で、サッポロミドリ並みに品質優れる。特に低温期での着莢性に優れ、ハウス、トンネル等の早出し栽培に最適。3粒莢の割合が高く、上物収量が多い。食味はサッポロミドリ並みで、極めて良好。

春の舞(はるのまい)の栽培時期



雪印種苗株式会社