

## —豆類専用の葉面散布資材—



# ジャックスパワー JACKSPOWER

秋から冬にかけての作型にぜひお試しください！

### ● 豆類に対するジャックスパワーの効果 ●




図1. さやいんげん




図2. そらまめ

### 使い方（試験基準）

	さやいんげん	そらまめ
処理時期	開花初期から1週間または2週間 間隔で収穫期間中連続散布	収穫節位の開花時に1週間間隔で 連続散布
使用量	20g / 水20ℓ / a (1000倍希釈)	20g / 水20ℓ / a (1000倍希釈)
効果	着莢促進	着莢促進

### ● 使用上の注意 ●

散布に際しては展着剤をご使用ください。  
水量および薬量は基準に添ってご使用ください。茎葉全面に十分散布すればより効果的です。  
農薬との混用散布はできませんが、強アルカリ剤・銅剤・ホルモン系農薬との混用はできません。

茎葉散布は朝夕の涼しい時に行ってください。  
調整した散布液はそのまま放置せず、その日のうちにご使用ください。  
保存に際しては直射日光は避け、涼しい場所に保管してください。  
食品ではありませんので、お口に入らないようにご注意ください。

府県向

もうかる品種をえらびましょう!

# 秋播きダイコン優良品種



雪印交配

## 春風太

**STEP I** 1dl元詰  
20ml

極晩抽性で耐寒性が強く、作り易い。  
肌がきれい、秀品率の高い春どり品種。

春風太の栽培時期

地 域	作型	月											
		10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9
一般地	ハウス	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	トンネルべたがけ			●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
暖地	ハウス		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	トンネルべたがけ		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
暖地沿岸部	露地べたがけ	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	



雪印交配

## 寒 関

**STEP I** 2dl元詰  
20ml

極晩抽性で、青首濃緑な春どり大根。  
空洞症の発生が少なく、揃い性が優れる。

寒関の栽培時期

地 域	作型	月											
		12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
東北 高冷地	トンネル栽培				●	●	●	●	●	●	●	●	●
	マルチべたがけ栽培				●	●	●	●	●	●	●	●	●
関東平原地	マルチべたがけ栽培		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	マルチべたがけ栽培		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
西日本平原地	マルチべたがけ栽培	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	



雪印交配

## 喜 太 一

**STEP I** 2dl元詰  
20ml

極晩抽性でひげ根が細く、揃いが特によい。  
規格内収量多く、初夏～夏どりに最適。

喜太一の栽培時期

地 域	作型	月											
		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
道南 道央	トンネル				●	●	●	●	●	●	●	●	●
	マルチ				●	●	●	●	●	●	●	●	●
北海道	露地				●	●	●	●	●	●	●	●	●
	マルチ				●	●	●	●	●	●	●	●	●
道東 道北	露地				●	●	●	●	●	●	●	●	●
	マルチ				●	●	●	●	●	●	●	●	●
東北・高冷地	トンネル				●	●	●	●	●	●	●	●	●
	マルチ				●	●	●	●	●	●	●	●	●
一般地	トンネル	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	マルチ	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
暖地	トンネル	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	



雪印種苗株式会社

〒062 8650 札幌市豊平区美園2条1丁目2番1号 ☎(011) 831 1161・FAX(011) 820 2582

<http://www.snowseed.co.jp/>

(本誌掲載記事の無断転載を禁じます)