

忙しい時期が終わってからゆっくり播ける...

雪印のお勧めの休閒緑肥作物

ハイオーツに続いてついに出た!センチュウを減らすニュークropp!!

ネグサレセンチュウ対抗作物

ねまへらそう(スーダングラス)

[特性]

- ・キタネグサレセンチュウを減らす!!!
- ・初期生育が旺盛で、雑草競合に強い!!
- ・6月播きでトウモロコシ、ソルゴー並みに多収!!
(乾物で1トン/10a)

[栽培方法]

- ・播種時期 5月下~6月下旬
- ・播種量 5kg/10a前後
- ・施肥量 N-P-Kを各8kg/10a程度
- ・栽培日数 2~3ヶ月(出穂前を目安)

注: 3ヶ月栽培し鋤き込み後すぐに後作を栽培する場合は、
チッソ飢餓防止のため裁断後に硫安等を散布してください。



すばらしい景観に...

極多収ひまわり

DK3875

[特性]

- ・茎が太く、極多収な春播き専用のひまわり!!
- ・VA菌根菌で後作小麦がリンサンを有効利用します!!
- ・今問題のパーティシリウム半身萎凋病に強い!
- ・トウモロコシ、ソルゴー並みに極多収!!

[栽培方法]

- ・播種量 1~1.5kg/10a
- ・播種期 5~6月
- ・施肥量 N-P-Kを各8kg/10a程度
- ・後作の減肥 チッソとカリで5kg/10a

* 後作には菌根菌と共生関係が強いスイートコーン、マメ類、
ムギ類が最適です。



サイレージの二次発酵に

サイロ見張番 MO

登場!

わしの自己紹介をしておこう
名前は「サイロ見張番MO」
有効成分は
アリルイソチオシアネート
(カラシ類の臭い成分)
じゃ



16cm

11cm



わしはサイロ見張番
二次発酵抑制に被験の効果
を發揮するわし
カニンギニン・L-リジン・L-グルタミン酸
グルタミン酸・L-アスパラギン酸
L-チロシン

わしが作るサイレージは、
塔型・タコ型・トビ型・キリン型・ターボ型
サイロにだけ
サイロ・タコ・タコ・L-リジン・L-チロシン
L-アスパラギン酸・L-グルタミン酸・L-チロシン
L-チロシン

使用方法

- ・本製品は、サイロ開封後のサイレージ取り出し面に使用します。
- ・本製品を使用直前にアルミ袋から取り出し、サイレージと混ざらないように、見張番専用シート(別売)のポケットに入れて使用して下さい。
- ・サイレージ取り出し作業時は、シートを剥ぎ、作業が終わったら再度被せて下さい。
- ・使用量はサイレージ取り出し面1m²あたり2個が基準です。見張番専用シートには、使用量に合わせてポケットを付けてあります。
- ・効果の持続期間は、アルミ袋開封後、約2ヶ月間です(温度や使用状態により有効期間が異なる場合があります。)使用期間が2ヶ月を越えたら、ポケットに入れてある分包を入れ替えて下さい。



雪印種苗株式会社

〒004 8531 札幌市厚別区上野幌1条5丁目1番8号 ☎(011)891 5911(代)・FAX(011)891 5774
<http://www.snowseed.co.jp/> (お問い合わせ)E mail:Inquire@snowseed.co.jp