

夏播きムギ類ラインナップ

エンバク



スーパーハヤテ「隼」 極早生

特 性：

他の極早生品種に比べて出穂が早く安定しているため、秋播きでの播種適期が最も長い。

草丈が高く、他の年内穫りエンバクよりも多収。

耐倒伏性に優れるため、収穫・水分調整が楽。

播種期：関東地方 8月下旬～9月上旬～9月中旬

西南暖地 9月上旬～9月中旬～9月下旬

東西南部 8月中下旬 イタリアン混播

年内にエンバク、翌春にイタリアンライグラスを収穫

播種量：6～8kg/10a

イタリアン混播の場合

3～4kg/10a (+イタリアン3kg/10a)



サビツヨシ 極早生

特 性：エンバクの重要病害である冠さび病に極強

播種期：関東地方 8月中旬～8月下旬

西南暖地 8月下旬～9月上旬

播種量：8～10kg/10a



ハイオーツ 早生

特 性：エンバクの中では細葉・細茎で乾燥しやすく、乾草・ロールベール利用に適する。

播種期：西南暖地 8月中旬～8月下旬

播種量：4～6kg/10a

オオムギ



ワセドリ2条

特 性：

エンバクに比較して乾き易く、乾草利用に最適。

オオムギ他社品種より乾物収量が高い。

うどんこ病に強く、耐倒伏性に優れるため利用し易い。

播種期：関東地方 8月下旬～9月中旬

西南暖地 9月上旬～9月下旬

播種量：8～10kg/10a

西南暖地向

今から播ける雪印のトウモロコシ『夏』シリーズ

スノーデント盛夏



品種特性

南方さび病抵抗性はクラスで極強。
耐倒伏性にも強く、台風にも安心。
草丈はやや短程で、青刈での作業が容易。
緑度保持が良好で、刈取適期が長い。

スノーデント王夏




品種特性

長稈・多葉な草姿で、二期作でも高い乾物収量を確保できる。
耐倒伏性に優れ、倒れにも折れにも強い。
南方さび病抵抗性品種。



左：他社品種

右：スノーデント盛夏



平成11年9月23日 台風18号(最大瞬間風速39.0m/秒)による影響(弊社宮崎研究農場)

南方さび病に強く、緑度保持良好!!

倒れにも折れにも強い!!

 **雪印種苗株式会社**

〒004 8531 札幌市厚別区上野幌1条5丁目1番8号 ☎(011)891 5911(代)・FAX(011)891 5774

http://www.snowseed.co.jp/ E mail:Inquire@snowseed.co.jp

お問い合わせ 北海道研究農場 ☎(01238)4 2121 E mail:Takashi.Yamazaki@snowseed.co.jp