

土づくりは

雪印の緑肥作物で!

府県向け

ねまへらそう



線虫対抗作物

【特性】

根物作物の大敵:キタネグサレセンチュウを減らすスーダングラスです。

ギニアグラスに比べ、種子が大きく、休眠がなく、播き易い。

【播種量】 5kg/10a

【播種期】

高冷地:6月上~7月下旬、一般地:5月下~8月上旬

暖地:5月上~8月下旬、ハウス:5~8月

【鋤込み期】 草丈:1.5m位を目安(栽培後60日)

つちたろう



線虫対抗作物

【特性】

府県の有害線虫:サツマイモネコブセンチュウを減らすソルゴーです。

栽培50~60日で5~6トンの粗大有機物を確保。

【播種量】 5kg/10a

【播種期】

高冷地:6月上~7月下旬、一般地:5月下~8月上旬

暖地:5月上~8月下旬、ハウス:5~8月

【鋤込み期】 草丈:2m位を目安

ソイルクリーン



線虫対抗作物

【特性】

サツマイモネコブセンチュウ・ジャワネコブセンチュウ・キタネコブセンチュウのネコブセンチュウの低減やキタネグサレ、ミナミネグサレセンチュウを低減。

根菜類や果菜類のセンチュウ対策に適したギニアグラスです。

細茎ですき込みやすく、ハウスのクリーニングクロープとしても最適です。

【播種量】 0.3~1.5kg/10a

【播種期】

高冷地:6月下~7月上旬、一般地:6月初~8月上旬

暖地:5月中~8月中旬

【鋤込み期】 草丈:1.5m位を目安(出穂前)

ネマキング



線虫対抗作物

【特性】

幅広い線虫(サツマイモ・ネコブ・キタネコブ・ジャワネコブ・ミナミネグサレ・クルミネグサレ、ナミイシユク・ダイズシストセンチュウ)を減らすクロタラリアです。

きれいな黄色い花と鋤込み易さが好評です。

【播種量】 6~9kg/10a

【播種期】

高冷地:6月上~7月下旬(ハウス)

一般地:6月中~7月中旬、暖地:5月上~8月上旬

【鋤込み期】 草丈:1~1.5m位を目安(開花期)

今こそ自給飼料を増産しましょう！

稲発酵粗飼料専用乳酸菌

畜草1号

ちく そう いち ごう

畜草1号とは・・・

- ・独立行政法人 農業・生物系特定産業技術研究機構 畜産草地研究所で選抜した乳酸菌株
- ・共同研究の結果、飼料イネサイレージに対して抜群の発酵促進&安定貯蔵効果が判明
- ・畜産草地研究所、埼玉県農林総合研究センター畜産研究所、雪印種苗で共同開発し、特許を取得(特許第3805727号)
- ・飼料イネに畜草1号を添加することで発酵過程で旺盛に増殖し、発酵品質改善、長期安定貯蔵と採食性向上が可能です。

※背景の電顕写真は「畜草1号」の乳酸菌株L.plantarum

緑色のストレッチフィルム



通年給与のための稲発酵粗飼料の長期貯蔵には十分な耐候性を持つエスラップグリーンをお試しください。



畜草1号を始め弊社が製造する乳酸菌は動物性原料※を一切使用しないA飼料です。

※「反すう動物用飼料への動物由来たん白質の混入防止に関するガイドライン」(平成15年9月16日付15消安第1570号)で規制対象となる原料



雪印種苗株式会社

〒004-8531 札幌市厚別区上野幌1条5丁目1番8号 ☎(011)891-5911(代)・FAX(011)891-5774

<http://www.snowseed.co.jp/index.html> E-mail:Inquire@snowseed.co.jp

お問い合わせ 北海道研究農場 ☎(0123)84-2121 FAX(0123)82-6101