

チャガラシ

辛神

からどん



すき込み適期

肥効果

- 茎葉にはカラシ成分が多く含まれています。
カラシ成分には殺菌効果があります。
- すきこむことで、カラシ成分が作用し
土壌中の**病原菌抑制**が期待できます。
- 収量もありますので、従来通りの
有機物補給として利用もできます。
- テンサイ根腐病、ジャガイモ黒あざ病、
ハウレンソウ萎凋病、トマト青枯病**などの
被害低減が期待できます。



開花した様

栽培のポイント

- 播種量: 0.7~1.0^{kg}/10a (裸種子)

○播種時期	北海道	5月、8月(夏播きはできるだけ早く)
	府県 寒・高冷地	5~6月、8月下旬~9月上旬(年内鋤き込み)
	府県 一般地	3~4月、10月中旬~11月上旬
	西南暖地	2~3月、10月下旬~11月中旬

春播き、夏播き

- 施肥量: NPKで各8^{kg}/10a
硫黄が含まれる肥料(**硫安等**)を利用すると有効成分(**カラシ成分**)の含量が増えます。
- 備考: すきこみ時期は、**着蕾~開花前の茎葉部の多い時期**に行ってください。
開花して結実するとカラシ成分が、花や子実に移行します。
茎葉に有効成分が多い時期にすきこむことで最大の効果が得られます。

注意事項


チャガラシはキカラシより晩生のため、花を期待する方はキカラシの利用をお勧めします。
前後作および周囲にアブラナ科野菜がある場合には、ハイオーツ等に切り替えてください。

今こそ自給飼料を増産しましょう！

かん きゅう
桿・球自在の乳酸菌で美味しいサイレージ！

サイレージ発酵の達人

サイマスター・新登場！！



Si-Master

牛にとっての主食となるサイレージ、そのサイレージが酪酸発酵に侵されるケースが増えています。

現場での酪酸発酵の事例から原因と対策を検討する一環で、乳酸菌のパワーアップを追及しました。

初期増殖の達人ラクトコッカス・ラクテリスSBS0001株と耐酸性の達人ラクトバチルス・パラカゼイSBS0003株。

この球菌と桿菌が発酵初期から給与するまで優占し、雑菌の増殖を許しません。

牧草由来のダブルの乳酸菌が今までにない乳酸発酵促進効果を実現。酪酸発酵を抑えて、
美味しいサイレージを作ります。



雪印種苗株式会社

〒004-8531 札幌市厚別区上野幌1条5丁目1番8号 ☎(011)891-5911(代)・FAX(011)891-5774

<http://www.snowseed.co.jp/index.html> E-mail:Inquire@snowseed.co.jp

お問い合わせ 北海道研究農場 ☎(0123)84-2121 FAX(0123)82-6101