

乳牛用サプリメント

「スーパーライザー」 「イチバンE」

①スーパーライザー

各種のビタミン類とUGF(未知成長因子)を高濃度に含有した乳牛専用サプリメントです。

②水溶性ビタミン

乳および乳脂肪生産・ケトージス予防に関与するナイアシン、脂肪酸代謝に関するコリン、繁殖に関与するパンテン酸などのビタミンB群を豊富に含有しています。

ある特定の期間や乳牛だけに一定量給与する、高濃度の栄養成分を含む飼料をサプリメントと呼び、現在はいろいろな乳牛用サプリメントが販売されていますが、今はその中から「スーパーライザー」と「イチバンE」について製品の特徴を紹介致します。

③UGF源

乳牛の第一胃内微生物の活性促進や、飼料の消化を助けるUGFを含有しています。

泌乳最盛期の乳生産や繁殖成績の維持向上に有効であり、育成牛では初回発情から受胎(八ヶ月齢前後)、一ヶ月齢位、乳牛では分娩の二週間前から分娩後約三ヶ月間の泌乳最盛期に、最も効果を發揮します。

●給与量の目安

濃厚飼料の一%、または

育成牛:二五~五〇g/日・頭

乳牛:一〇〇g/日・頭

●給与量の目安

ビタミンAとEを高濃度に含有したサプリメントで乳質改善に効果を発揮します。

①ビタミンA

ビタミンAとEを高濃度に含有したサプリメントで乳質改善に効果を発揮します。

②ビタミンE

乳腺上皮組織や乳管粘膜を保護し免疫力を増加、体内に侵入した異物を無毒化・排除します。

乳腺上皮組織や乳管粘膜を保護し免疫力を増加、体内に侵入した異物を無毒化・排除します。

成分含量(1kg中)

	ビタミンA	ビタミンD ₃	ビタミンE	ビタミンB ₁	ビタミンB ₂	ビタミンB ₃	ナイアシン	コリン	パンテン酸	炭酸亜鉛	硫酸亜鉛メチオニン
スーパーライザー	1,500,000IU	500,000IU	2,000mg	102mg	400mg	1mg	60,000mg	135,000mg	20,000mg	—	—
イチバンE	7,000,000IU	—	30,000mg	—	—	—	—	—	—	14,000mg	20,000mg

鉛・硫酸亜鉛メチオニンが含まれています。セレンはビタミンEと同様に酸化的攻撃から組織を保護する作用を持ち、ビタミンEと一緒に酸化物により一層の効果を発揮します。亞鉛は皮膚や蹄などの中で不足がちになります。イチバンEを給与することによって蹄病や乳頭部の損傷を予防する効果があります。

●給与量の目安

乳牛:五〇g/日・頭を配合飼料に混じて給与。但し、全飼料への混入割合は3%以下。


スーパーライザー(ナイアシン)が持つ疾効果は併用することによりさらに効果が増します。

の上皮組織の形成に重要な役割を果たします。が、日々の生産活動の中で不足がちになります。セレンはビタミンEと同様に酸化的攻撃から組織を保護する作用を持ち、ビタミンEと一緒に酸化物により一層の効果を発揮します。亞鉛は皮膚や蹄などの中で不足がちになります。イチバンEを給与することによって蹄病や乳頭部の損傷を予防する効果があります。

鉛・硫酸亜鉛メチオニンが含まれています。セレンはビタミンEと同様に酸化的攻撃から組織を保護する作用を持ち、ビタミンEと一緒に酸化物により一層の効果を発揮します。亞鉛は皮膚や蹄などの中で不足がちになります。セレンはビタミンEと一緒に酸化物により一層の効果を発揮します。

鉛・硫酸亜鉛メチオニンが含まれています。セレンはビタミンEと一緒に酸化物により一層の効果を発揮します。

本社 〒062-8650 札幌市豊平区美園二条一丁目
TEL(011)831-1161
FAX(011)820-12582
雪印種苗株式会社
編集発行人 菊地庸



目盛り1は乳牛のビタミン要求量の基準値。当社のガイドラインでは、ビタミンA・D₃・ナイアシンがNRC等より高く設定されており、スーパーライザーは当社ガイドラインを満たすように設計されています。