

緑肥作物を取り入れた作付体系例



主作物
 主作物が圃場にある期間

		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	
		おすすめ品種								
秋播きコムギ	後作利用	秋播きコムギ					ヘイオーツ・辛神・キカラシ・まめ助・まめゆたか・NSクルナ。 R-007	✕	✕	
	間作利用&後作利用 ダイズシストセンチュウ対策 (P.27)	秋播きコムギ					メジウムを畝間に中播き	✕	✕	
		秋播きコムギ					くれない	✕	✕	
休閑利用 ねまへらそう・キタネグサレセンチュウ対策	つちたろう・トウモロコシ(SH9599)・ねまへらそう・NSクルナ。					秋播きコムギ				
テンサイ	前作アブラナ科利用 キカラシ・穂収量の増収効果期待 辛神:テンサイ根腐病軽減(P.24)	秋播きコムギ					前年キカラシ・辛神	✕	✕	
ジャガイモ	隔離と防風作物 (P.26)	ジャガイモ					とちゆたか YYYYYYYYYYYYYYYYYYY ▲-▲ ドリフトガード効果(草丈:90-100cm程度)			
タマネギ	連作障害回避と減肥対策 (P.28)	タマネギ					まめ助・+スワン	✕	✕	
ダイコン	キタネグサレ センチュウ対策 (P.21)	春ダイコン					ヘイオーツ 腐熟期間は1ヶ月を目安に	✕	✕	
ニンジン ゴボウ・ナガイモ	線虫対策 (P.21)	翌年ニンジン					前年ヘイオーツ	✕	✕	
トマト・キュウリ (ハウス)	土づくり (P.29)	栽培期間は2か月程度を目安に					前年ヘイオーツ	✕	✕	
		前年つちたろう・ねまへらそう。					翌年トマト	R-007(翌年春すき込み)	✕	✕
ハクサイ・キャベツ ブロッコリー	アブラナ科野菜 根こぶ病対策と土づくり (P.8)	翌年ブロッコリー					前年ヘイオーツ	✕	✕	
ホウレンソウ トマト・キュウリ(ハウス)	ハウスの病害対策 (P.24)	翌年ハクサイ					後作物(ホウレンソウなど)			
		翌年キャベツ					前年辛神	✕	✕	
ドリフトガード クロープ	隔離と防風作物 (P.26)	とちゆたか YYYYYYYYYYYYYYYYYYY ▲-▲ ドリフトガード効果					つちたろう・ねまへらそう。 YYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY ▲-▲ ドリフトガード効果			
遊休地の土づくり	年2作	ヘイオーツ・藤えもん・くれないなど					ヘイオーツ	✕	✕	
	年1作	つちたろう・ねまへらそう・トウモロコシ(SH9599)					✕			

※商品名で表記しているものには*を付記しています。

緑肥作物について